亲近大自然系列

野外观花手册

第二版

叶喜阳　华国军　陶一舟　著



野花编织了大地绝美的画卷，它们诗意地呈现，静静地守候着生命的荣枯，随性而自在。

笔者行走大江南北，跋山涉水，穿行山林旷野，用相机记录下充满天地灵秀的野花，在此与读者共享。

拥有了此书，您将会得到一本经典的观花指南，带上这本书一起去野外赏花吧！

化学工业出版社

- 长期从事植物资源研究的专业人员及“踏花行”网站创始人共同编著
- 本版侧重于全国的野花，西南、东南野花资源丰富、特别，比第一版关注更多
- 从数十万张数码相片中选取的精华图片奉献给读者
- 不仅有花的还有整体的、叶片的图片
- 重点特征用标注线标注，便于识别，鉴赏

ISBN 978-7-122-21802-5

9 787122 218025 >

销售分类建议：生物 / 植物；大众生活

编辑投稿信箱：tarker_lily@126.com

定价：59.00 元

亲近大自然系列

野外观花手册

第二版

叶喜阳　华国军　陶一舟　著

化学工业出版社
北京

本手册由长期从事植物资源研究的专业人员及“踏花行”网站创始人共同编著而成，编著者经过多年的实地考察研究，拍摄了大量的数码相片，现从数十万张数码相片中选择了部分精华种类，并依据各类专业植物志及相关文献论文，对这些植物进行科学鉴定，部分疑难类群还请教了相关类群的权威专家进行核实，以求鉴定准确，最后通过精心组织，编著成册。每种植物内容包括：图片、中文名、拉丁学名、形态描述、花期、生境、分布、观赏及其他用途等。该册收录种类主要包括：华东、西南、秦岭、太白山、华南等区域野生植物种类。

本手册可供自然爱好者、户外活动爱好者、园林工作者、植物及园林专业师生、自然科普工作者等参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

野外观花手册 / 叶喜阳，华国军，陶一舟著 . —2 版 .
北京：化学工业出版社，2014.11
（亲近大自然系列）
ISBN 978-7-122-21802-5

Ⅰ . ①野… Ⅱ . ①叶…②华…③陶… Ⅲ . ①野生植物 – 花卉 – 中国 – 手册 Ⅳ . ① Q949.408-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 208058 号

责任编辑：李　丽　　装帧设计：关　飞
责任校对：吴　静

出版发行：化学工业出版社
（北京市东城区青年湖南街 13 号　邮政编码 100011）
印　　装：北京画中画印刷有限公司
710mm × 1000mm　1/32　印张 10 1/2　字数 235 千字
2015 年 2 月北京第 2 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）
售后服务：010-64518899
网　　址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：59.00 元

版权所有　违者必究

前言

野花，是自然演化的美丽奇迹。它们充满生机，处处开放。无论是天寒地冻的两极，还是干旱极热的戈壁，乃至风急浪高的海岸，都自在而生，生机无限。它们既无顾影自怜的伤感，更无谄媚他物的姿态。无论曲直也好，疏密也罢，还是芳香有无，艳丽与否，全是随心随性地生长。正如我们赋予“野花”之名一样；向野而生的自然天性有机地融合了花的色香本性。

人类对待野花，多是利用、保护和赏鉴兼有的。民间有言“常饮百花酒，活到九十九”，可见花酿深得人心。宋代的苏东坡也有“一斤松花不可少，八两蒲黄切莫炒，杏花槐花各五钱，两斤白蜜一起捣”的诗句，野花作为药用食材，也被广泛应用。而论及花卉产业中任何一类名花，无不是源自野生的血统，类如山茶、月季、杜鹃等，都是在经引种驯化后才声名鹊起的。

对大多数人而言，也许熙来攘往的社会生活让我们远离了野花太久太久，又或许经过培育的花卉相伴时间太长，当我们把审美疲劳的眼光转向了野花，在山野深涧，甚至于田间巷陌间，总能不经意地因那星星点点的野花而与自然亲近许多，一如沧浪之水一般，涤除身心的尘埃，有了清清爽爽之感。

这的确是一种绝佳的选择。正因为这种转变，才有了“野芳发而幽香”“众花飘尽野独秀”的异趣，也才有了游目骋怀，极视听之娱的愉悦感受，更有了对生命的敬畏之感。阿来在《草木的理想国》中说：“生活在这个世界上，我就要尽力去了解这个世界。既然身处的这个自然界如此开阔敞亮，就要试图以谦逊的姿态进入它、学习它。”于是他写下了关于早樱、栀子、紫薇、丁香、芙蓉等等的故事，开启了一扇“及物”的大门。他用流淌的文字告诉我们，如果一个人不能爱置身其间的这块土地，以及这土地上生长而出的万物生灵，那么这

个人所有关于爱的言辞可能都是空洞的——因而也是虚假的。

正因为有了野花们朴素的存在，那种温和而不缺乏热烈，水灵丰腴而又并不张扬的秀色，也才有了野花固众芳所在的性灵和品格。天地有大美而不言，野花编织了大地间绝美的画卷，它们诗意地呈现，静静地守候着生命的荣枯，随性而自在。

笔者行走于大江南北，跋远山涉近水，穿行于山林旷野，用手中的相机记录下一幅幅生动香艳的画面，在此与诸读者共同分享。再者，自然物种的科学定名也为自然爱好者们准备了一份额外的礼物，喜欢沾花惹草的小伙伴们再也不会为了叫不上那些常见野花的名字而困惑了！

第一版出版后很受读者欢迎，于短期内售罄，不少读者也提出了一些宝贵意见，强烈要求再出新版，出版社在原作者不同意再版的情况下，更换了作者重新编写，本版是由长期从事植物资源研究的专业人员及“踏花行”网站创始人共同编著而成的，跟第一版题材相同，内容不同，本版侧重于全国的野花，西南、东南由于野花资源丰富、特别，因此比第一版关注更多，图片是从数十万张数码相片中选取的精华图片，不仅有花的还有整体的、叶片的图片，更便于识别，鉴赏。本版重点收录华东、西南、秦岭地区的植物种类，植物的编排按照克朗奎斯特系统对科进行排序。考虑到华东区域经济发达，植物爱好者众多，花卉苗木市场繁荣、理念先进，对乡土植物开发有极大需求，该地区乡土野花的介绍能给大家提供很好的参考素材。西南地区是我国的植物基因库，各类兰花、凤仙花、四大高山花卉种类丰富，这些美艳的高山野花在西南的山区异彩纷呈，每位亲历的人都会惊叹于这些千姿百态、五颜六色的精灵。拥有了此书，你将会得到一本经典的观花指南。

此书的顺利出版，需要感谢提供部分图片的朋友：刘军、徐晔春、蒋虹；同时，还要感谢我们的家人，你们的支持为我们提供了源源不断的动力。

谨以此书献给那些迷恋自然风景和山野花草的自然痴迷者们！

著者

2014年8月

目录

一、植物主要器官及形态描述专用名词 /1

果 /1
房县槭 /1
山核桃 /1
薜荔 /2
黄花木 /2
欧洲油菜 /3
花 /3
春兰 /3
点地梅 /4
蝶豆 /4
非洲菊 /5
枫杨 /5
华东野核桃 /6
山核桃 /6
黄堇 /7
天师栗 /7
心叶碎米荠 /8
浙贝母 /8
紫丁香 /9
芽 /9
山核桃 /9
叶 /10
蜡瓣花 /10
浙闽樱桃 /10
榉树 /11
绒毛润楠 /11
树参 /12
浙江冬青 /12
浙江樟 /13
壮大聚花荚蒾 /13
黄山花楸 /13
野含笑 /14
榆橘 /14
北重楼 /14
海桐 /15
乐昌含笑 /15
平翅三角槭 /15

二、300种常见野花 /16

木兰科 /16
深山含笑 /16
天女木兰 /17
蜡梅科 /18
山蜡梅 /18
金粟兰科 /19

草珊瑚 /19
丝穗金粟兰 /20
三白草科 /21
三白草 /21
白苞裸蒴 /22
马兜铃科 /23
杜衡 /23
细辛 /24
马兜铃 /25
八角科 /26
红毒茴 /26
五味子科 /27
南五味子 /27
莼菜科 /28
莼菜 /28
毛茛科 /29
黄三七 /29
驴蹄草 /30
乌头 /31
还亮草 /32
草玉梅 /33
鹅掌草 /34
石龙芮 /35
女萎 /36
绣球藤 /37
蕨叶人字果 /38
偏翅唐松草 /39
华东唐松草 /40
天葵 /41
无距耧斗菜 /42
三裂碱毛茛 /43
黄牡丹 /44
川赤芍 /45
小檗科 /46
六角莲 /46
桃儿七 /47
三枝九叶草 /48
庐山小檗 /49
阔叶十大功劳 /50
大血藤科 /51
大血藤 /51
木通科 /52
猫儿屎 /52
木通 /53
钝药野木瓜（短药野木瓜） /54
罂粟科 /55
荷青花 /55
血水草 /56
博落回 /57
五脉绿绒蒿 /58
刻叶紫堇 /59
夏天无 /60
金缕梅科 /61
蜡瓣花 /61
红花荷 /62
檵木 /63

金缕梅 /64
荨麻科 /65
庐山楼梯草 /65
商陆科 /66
垂序商陆 /66
苋科 /67
青葙 /67
石竹科 /68
剪秋罗 /68
雀舌草 /69
蝇子草 /70
繁缕 /71
孩儿参 /72
蓼科 /73
红蓼 /73
头花蓼 /74
刺蓼 /75
掌叶大黄 /76
羊蹄 /77
两栖蓼 /78
金荞麦 /79
山茶科 /80
毛柄连蕊茶 /80
紫茎 /81
格药柃 /82
猕猴桃科 /83
中华猕猴桃 /83
藤黄科 /84
黄牛木 /84
梧桐科 /85
马松子 /85
锦葵科 /86
梵天花 /86
茅膏菜科 /87
圆叶茅膏菜 /87
堇菜科 /88
七星莲 /88
紫花地丁 /89
南山堇菜 /90
双花堇菜 /91
葫芦科 /92
王瓜 /92
绞股蓝 /93
秋海棠科 /94
裂叶秋海棠 /94
中华秋海棠 /95
山柑科 /96
鱼木 /96
十字花科 /97
荭菜 /97
大叶碎米荠 /98
匍匐南芥 /99
豆瓣菜 /100
云南山萮菜 /101
杜鹃花科 /102
吊钟花 /102

宽叶杜香 /103
满山红 /104
马银花 /105
云锦杜鹃 /106
马缨杜鹃 /107
陕西杜鹃 /108
红棕杜鹃 /109
毛果珍珠花 /110
江南越橘 /111
鹿蹄草科 /112
独丽花 /112
水晶兰 /113
岩梅科 /114
红花岩梅 /114
安息香科 /115
玉铃花 /115
白花龙 /116
赤杨叶 /117
小叶白辛树 /118
山矾科 /119
白檀 /119
报春花科 /120
落地梅 /120
临时救（聚花过路黄） /121
狼尾花 /122
七瓣莲 /123
琉璃繁缕 /124
秦巴点地梅 /125
紫罗兰报春 /126
安徽羽叶报春 /127
苣叶报春 /128
鹅黄灯台报春 /129
钟花报春 /130
紫花雪山报春 /131
偏花报春 /132
海桐花科 /133
海桐 /133
景天科 /134
小丛红景天 /134
紫花八宝 /135
东南景天 /136
山飘风 /137
虎耳草科 /138
宁波溲疏 /138
浙江山梅花 /139
草绣球 /140
蜡莲绣球 /141
七叶鬼灯檠 /142
岩白菜 /143
虎耳草 /144
黄水枝 /145
日本金腰 /146
梅花草 /147
蔷薇科 /148
菱叶绣线菊 /148
白鹃梅 /149

中华石楠 /150
毛山荆子 /151
野草莓 /152
银露梅 /153
棣棠花 /154
峨眉蔷薇 /155
迎春樱桃 /156
豆科 /157
云实 /157
龙须藤 /158
云南高山豆 /159
紫藤 /160
庭藤 /161
多花胡枝子 /162
百脉根 /163
香花崖豆藤 /164
广布野豌豆 /165
大托叶猪屎豆 /166
黄花木 /167
野大豆 /168
胡颓子科 /169
木半夏 /169
千屈菜科 /170
圆叶节节菜 /170
瑞香科 /171
橙花瑞香 /171
毛瑞香 /172
芫花 /173
了哥王 /174
柳叶菜科 /175
柳叶菜 /175
野牡丹科 /176
地菍 /176
过路惊 /177
星毛金锦香 /178
山茱萸科 /179
四照花 /179
槲寄生科 /180
槲寄生 /180
蛇菰科 /181
筒鞘蛇菰 /181
大戟科 /182
泽漆 /182
远志科 /183
瓜子金 /183
省沽油科 /184
野鸦椿 /184
玫红省沽油 /185
无患子科 /186
倒地铃 /186
芸香科 /187
臭节草 /187
酢浆草科 /188
山酢浆草 /188
牻牛儿苗科 /189
野老鹳草 /189

毛蕊老鹳草 /190
凤仙花科 /191
牯岭凤仙花 /191
天目山凤仙花 /192
绿萼凤仙花 /193
华凤仙 /194
伞形科 /195
直刺变豆菜 /195
紫花前胡 /196
龙胆科 /197
五岭龙胆 /197
深红龙胆 /198
喉毛花 /199
大钟花 /200
萝摩科 /201
牛皮消 /201
竹灵消 /202
茄科 /203
龙葵 /203
白英 /204
茄参 /205
红丝线 /206
旋花科 /207
篱栏网 /207
飞蛾藤 /208
三裂叶薯 /209
睡菜科 /210
睡菜 /210
紫草科 /211
梓木草 /211
倒提壶 /212
马鞭草科 /213
海州常山 /213
单花荻 /214
唇形科 /215
金疮小草 /215
毛药花 /216
野芝麻 /217
水苏 /218
石荠苎 /219
香薷 /220
四轮香 /221
木犀科 /222
流苏树 /222
辽东丁香 /223
玄参科 /224
毛蕊花 /224
天目地黄 /225
阿拉伯婆婆纳 /226
长腺小米草 /227
沙氏鹿茸草 /228
大卫氏马先蒿 /229
华马先蒿 /230
穗花马先蒿 /231
藓生马先蒿 /232
列当科 /233

白花列当 /233
苦苣苔科 /234
苦苣苔 /234
降龙草 /235
吊石苣苔 /236
浙皖粗筒苣苔 /237
牛耳朵 /238
闽赣长蒴苣苔 /239
爵床科 /240
白接骨 /240
少花马蓝 /241
圆苞杜根藤 /242
胡麻科 /243
茶菱 /243
狸藻科 /244
高山捕虫堇 /244
挖耳草 /245
桔梗科 /246
山梗菜 /246
铜锤玉带草 /247
金钱豹 /248
蓝花参 /249
沙参 /250
茜草科 /251
玉叶金花 /251
鸡矢藤 /252
白马骨 /253
忍冬科 /254
血满草 /254
蝴蝶戏珠花 /255
北极花 /256
糯米条 /257
鬼吹箫 /258
郁香忍冬 /259
败酱科 /260
蜘蛛香 /260
刺参科 /261
白花刺参 /261
川续断科 /262
川续断 /262
菊科 /263
甘肃多榔菊 /263
东风菜 /264
陀螺紫菀 /265
普陀狗哇花 /266
大头橐吾 /267
林荫千里光 /268
大吴风草 /269
野菊 /270
加拿大一枝黄花 /271
天南星科 /272
滴水珠 /272
一把伞南星 /273
鸭跖草科 /274
水竹叶 /274
杜若 /275

谷精草科 /276
谷精草 /276
香蒲科 /277
水烛 /277
姜科 /278
郁金 /278
姜花 /279
雨久花科 /280
凤眼蓝 /280
鸭舌草 /281
百合科 /282
卷丹 /282
药百合 /283
大百合 /284
长梗黄精 /285
菖头（荞头） /286
萱草 /287
大花万寿竹 /288
管花鹿药 /289
延龄草 /290
七筋姑 /291
西藏洼瓣花 /292
山菅 /293
老鸦瓣 /294
石蒜科 /295
石蒜 /295
忽地笑 /296
鸢尾科 /297
西南鸢尾 /297
玉蝉花 /298
射干 /299
百部科 /300
百部 /300
薯蓣科 /301
黄独 /301
水玉簪科 /302
纤草 /302
兰科 /303
西藏杓兰 /303
杏黄兜兰 /304
广布小红门兰 /305
石斛 /306
斑叶兰 /307
金线兰 /308
无柱兰 /309
白及 /310
美冠兰 /311
蕙兰 /312
竹叶兰 /313
石仙桃 /314
虾脊兰 /315

三、参考文献 /316
四、拉丁学名索引
（按英文顺序） /318
五、中文名索引
（按拼音顺序） /322

一、植物主要器官及形态描述专用名词

果

房县槭

山核桃

薜荔

黄花木



欧洲油菜

花

春兰

点地梅



蝶豆



头状花（头状花序）：由多数花组成头状花序，常包括外围的舌状花和内部的管状花，有时全部为舌状花或全为管状花。

非洲菊

穗状花序：花无梗，排列成总状

枫杨

雌花：缺少雄蕊的花，仅具雌蕊部分。

华东野核桃

山核桃

距：花瓣延长的附属物。

黄堇

圆锥花序：具由总状花序再排列而形成圆锥状。

天师栗

十字花：花瓣4瓣，排列为十字形，6枚雄蕊，外围2枚短，内轮4枚长。

心叶碎米荠



花结构：一朵完整的花包括花梗、花托、花萼、花冠、雌蕊、雄蕊等部分。

浙贝母

合瓣花：所有花瓣合生为一花筒。

紫丁香



芽

山核桃

山核桃：芽裸露而不为鳞片所包裹。

叶

植物进行光合作用的器官，提供植物所需养分。

蜡瓣花

浙闽樱桃

锯齿：叶边缘不平滑，有锯齿，锯齿形态各异，有钝锯齿、细锯齿、牙齿状、尖锐锯齿、桃形锯齿等。

榉树

全缘：叶边缘平滑完整，没有缺刻或锯齿或裂片。

绒毛润楠



掌状裂：叶边缘裂口深，裂片呈掌状排列。

树参

刺齿：锯齿尖锐呈刺状。

浙江冬青

三出脉：从叶基部分出三条平直且彼此接近平行的明显主脉。

浙江樟



羽状脉：从叶中脉向两边分出较大的支脉，并在两边呈羽毛状排列。

壮大聚花荚蒾

羽状复叶：一枚叶上具多枚小叶，各小叶在叶轴上排列成羽毛状。

黄山花楸

单叶：叶柄上仅着生一枚叶，且叶柄与叶之间无关节。

野含笑

掌状复叶：各小叶集生于总叶柄顶端，呈掌状展开排列。

榆橘

叶轮生：茎的每节上着生多枚叶，呈轮盘状。

北重楼

叶簇生：叶多枚集中于枝顶端。

海桐

叶互生：茎的每节仅着生一枚叶，相邻节上的叶片着生在茎的不同侧。

乐昌含笑

叶对生：茎的每一节上有二枚叶，分别着生在茎的相对两侧。

平翅三角槭



二、300种常见野花

木兰科

深山含笑

Michelia maudiae

木兰科，含笑属。常绿乔木。各部无毛；在芽、嫩枝、叶下部、苞片上具白粉。革质叶长椭圆形，互生，全缘。花被片9，纯白色，具芳香。聚合蓇葖果长圆至卵圆形。种子红色。

花期：2 ~ 3月。**生境：**中海拔山区密林中。

分布：浙江、福建、湖南、贵州、香港及广东、广西。

观赏或其他用途：花大、洁白美丽具芳香，优良庭院观赏树；花可提取芳香油，亦可供药用。

天女木兰

Oyama sieboldii

别名：天女花

木兰科，天女花属。落叶小乔木。叶膜质，互生，倒卵形或宽倒卵形，先端短尖；上面脉上有弯曲柔毛，下面被多细胞毛，还散生金黄色点。花叶同放，花常下垂；花被片9，白色。聚合果熟时变红，倒卵圆形或长圆形。

花期：5 ~ 6月。

生境：海拔1600 ~ 2000米山地林中。

分布：华东及辽宁、广西等省区。

观赏或其他用途：花洁白美丽，下垂的花朵娇羞可爱，优良庭院观赏树；花入药，可制浸膏。

山蜡梅

Chimonanthus nitens

蜡梅科，蜡梅属。常绿灌木。叶纸质至近革质，全缘，对生，椭圆形至长圆状披针形，叶正面具光泽，背面脉上及叶柄有短柔毛。花生叶腋，黄色或黄白色，蜡质，花被片多数，阔卵形至线形，具芳香。瘦果圆柱状。

花期：10月～翌年1月。

生境：山区低海拔疏林中。

分布：长江以南各省区及陕西省。

观赏或其他用途：花色素雅芳香，于秋冬季节开放，能为寒冷季节增添生气，良好的园林观赏植物；根可药用。

草珊瑚

Sarcandra glabra

金粟兰科，草珊瑚属。常绿灌木。茎上有膨大节。叶革质，对生，边缘具粗锐锯齿。穗状花序顶生，常呈圆锥状，花小，黄绿色。核果球形，成熟时亮红色。

花期：6月。

生境：海拔1500米以下的山坡及沟谷阴湿处。

分布：华东、华南及西南各省。

观赏或其他用途：株形紧凑，叶色亮绿，果红艳美丽，可种植于林下做地被观赏；全株可入药。

丝穗金粟兰

Chloranthus fortunei

别名：四块瓦

金粟兰科，金粟兰属。多年生草本。单叶对生，通常4枚生枝顶，纸质，宽椭圆形至倒卵形，边缘具圆齿或粗齿，齿间有腺体，近基部全缘。花序穗状，单一，生于茎顶；花小，白色，有香气。核果球形。

花期：4 ~ 5月。

生境：低海拔山坡或林下。

分布：华东、华南及华中和西南的部分省区。

观赏或其他用途：本种株形小巧，花色洁白，可种于林下作地被观赏；全草供药用；有毒。

三白草

Saururus chinensis

三白草科，三白草属。多年生湿生草本。叶纸质，全缘，阔卵形至卵状披针形，在茎上互生，基部心形。总状花序白色，在茎顶与叶对生，下面具显眼的白色苞片，苞片与叶同形；花小，花被缺。

花期：4 ~ 7月。

生境：沟边、水塘、溪边或沼泽地。

分布：华东、华南、华中及华北部分省区。

观赏或其他用途：花苞片色彩洁白美丽，观赏性极佳，可成片种植于湿地供观赏，也可盆栽；全草可入药。

白苞裸蒴

Gymnotheca involucrata

三白草科，裸蒴属。多年生草本。叶纸质，互生，全缘，心形或肾状心形，基部具2深耳，托叶抱茎。花序穗状，单生于茎中部与叶对生，最下3 ~ 4片苞片白色，叶状。

花期：2 ~ 6月。

生境：海拔1000米左右的山坡或湿地。

分布：四川南部。

观赏或其他用途：可栽培作地被观赏，白色苞片可爱惹眼；全株可入药。



杜衡

Asarum forbesii

马兜铃科，细辛属。多年生草本。根状茎短，不显。叶阔心形至肾心形，全缘，正面深绿色且常在两旁具白色云斑。花单生叶腋，藏于叶片下而不显眼，暗紫色，花被管钟状或筒状，内壁具格子网眼，花被裂片较短。

花期：4 ~ 5月。

生境：林下或沟边土壤疏松环境。

分布：华东及河南、湖北、四川等省。

观赏或其他用途：叶片花纹极具观赏价值，可种于林下做地被观赏，也可作小盆栽观赏。

细辛

Asarum sieboldii

马兜铃科，细辛属。多年生草本。叶常2枚，心形或卵状心形，全缘，正面疏被短毛。花生于叶腋，紫黑色；花被管钟状，内壁有疏离纵行脊皱；花被裂片三角状卵形。果近球形。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔1000 ~ 2000米林下阴湿且富含腐殖土环境。

分布：华东及河南、湖北、陕西、四川等省。

观赏或其他用途：多种蝴蝶以该植物叶片为食，可作为饲养蝴蝶的好材料。

马兜铃

Aristolochia debilis

马兜铃科，马兜铃属。多年生草质藤本。叶纸质，三角形、长圆状卵形或戟形，全缘。花1～2朵生于叶腋；花被管长，基部膨大呈球形，管细长，管口又扩大呈漏斗状，黄绿色，口部有紫色斑。蒴果椭圆状球形。

花期：7～8月。

生境：海拔1500米以下的路旁、沟边或山谷、山坡灌丛。

分布：山东、河南及长江以南各省区。

观赏或其他用途：花形奇特，也是多种蝴蝶幼虫的食物。

红毒茴

Illicium lanceolatum

别名：披针叶茴香 披针叶八角

八角科，八角属。常绿小乔木。叶革质，披针形或倒披针形，全缘，互生或在枝顶端簇生。花1 ~ 3朵生于枝顶或叶腋，红色；花被片10 ~ 15，肉质，心皮10 ~ 14枚。蓇葖果呈轮盘状排列。

花期：4 ~ 6月。

生境：海拔300 ~ 1500米的阴湿林中或溪边沟谷旁。

分布：华东及湖北、湖南、贵州等省。

观赏或其他用途：叶色浓绿，花色彩鲜艳，可作耐阴观赏植物；果具有毒性，勿作佐料八角茴香混用（八角的蓇葖一般不多于8个，产广西）。

南五味子

Kadsura longipedunculata

五味子科，南五味子属。常绿木质藤本。叶长圆状披针形至卵状长圆形，边缘具疏齿，上面深绿色。花单生叶腋，雌雄异株；花被片白色或淡黄色，8～17片，肉质，花梗细长。聚合果球形，成熟时红色或紫红色。

花期：6～9月。

生境：海拔1000米以下山坡、溪谷边的灌木林中。

分布：长江流域以南各省。

观赏或其他用途：叶色四季浓绿，花果均有观赏价值，可种植于藤架上观赏；果还可鲜食。

莼菜

Brasenia schreberi

莼菜科，莼菜属。多年生浮水草本。叶椭圆状矩圆形，叶柄盾状着生，叶边缘全缘，下面蓝绿色，上面绿色，两面无毛。花单生叶腋，萼片3 ~ 4，花瓣状，紫红色。

花期：5 ~ 7月。

生境：水田、池塘、湖泊或沼泽地中。

分布：浙江、江苏、江西、湖南、四川、云南等省。

观赏或其他用途：叶圆润可爱，可种于水缸或玻璃缸中观赏；嫩茎叶作蔬菜食用，入口滑溜，味道鲜美，西湖莼菜是杭州名菜。

黄三七

Souliea vaginata

别名：长果升麻

毛茛科，黄三七属。多年生宿根草本。叶常2枚，二至三回三出全裂，叶片三角形，边缘具不等锯齿。总状花序具4～6朵花，花先叶开放，萼片花瓣状，白色或淡粉红色，先端具蚀齿状，花瓣隐于内部，不显眼。蓇葖果长条状，直立。

花期：5～6月。

生境：海拔2500～4000米的山间林下、林缘或草丛中。

分布：西南至秦岭一带。

观赏或其他用途：根状茎可入药。

花先叶开放

蓇葖果长条状，直立

驴蹄草

Caltha palustris

毛茛科，驴蹄草属。多年生草本。叶片圆形至心形，基生叶3 ~ 7，茎生叶逐渐变小，叶边缘全部为三角形齿，光滑无毛。单歧聚伞花序生于茎或分枝顶部；萼片5，黄色，花瓣状；心皮5 ~ 12。蓇葖果。

花期：5 ~ 8月。

生境：海拔1000 ~ 4000米的山地或山谷溪边或湿地草甸等处。

分布：华北、华东、华中、西南等省均有分布。

观赏或其他用途：叶圆润可爱，花鲜艳美丽，可种植于林下潮湿处或湿地作地被观赏。

乌头

Aconitum carmichaeli

毛茛科，乌头属。多年生草本。块根倒圆锥形。叶片五角形，三裂几达基部，裂片再羽状裂，茎下部叶开花时枯萎。总状花序顶生，具多花；萼片蓝紫色，上萼片高盔状；花瓣隐于萼片内，与萼片同色。蓇葖果三棱形。

花期：9 ~ 10月。

生境：山地草丛或灌丛中。

分布：全国除西北和吉林、黑龙江等省基本都有分布。

观赏或其他用途：叶形秀丽，花序硕大且色彩艳丽，可栽培于林缘或花境供观赏；根可药用但有剧毒，使用时需谨遵医嘱。

还亮草

Delphinium anthriscifolium

毛茛科，翠雀属。一年生草本。叶菱状卵形或三角状卵形，二至三回近羽状分裂间或三出复叶，末回裂片狭卵形或披针形。总状花序；萼片堇色或紫色；花瓣紫色，上部变宽；心皮3。蓇葖果。

花期：3 ~ 5月。

生境：中低海拔的山坡、路边、溪边草丛。

分布：华中、华东、华南及山西、贵州等省。

观赏或其他用途：花小巧可爱，色彩鲜艳，可播种作野花观赏。

草玉梅

Anemone rivularis

毛茛科，银莲花属。多年生草本。基生叶3 ~ 5，具长柄；叶肾状五角形，三全裂，各裂片再不等深裂，两面有糙伏毛。聚伞花序有2 ~ 3回分枝，苞片似基生叶；花直径3厘米，萼片7 ~ 8，白色，花瓣状，倒卵形或椭圆状倒卵形；多雄蕊，多心皮。瘦果狭卵球形，具钩状弯曲的宿存花柱。

花期：5 ~ 8月。

生境：中高海拔的山地草坡、水边或林缘。

分布：华南、西南及湖北等省。

观赏或其他用途：常在山坡星星点点或成片分布于草丛中，花小巧洁白，十分耐看的野生花卉。

鹅掌草

Anemone flaccida

毛茛科，银莲花属。多年生草本。基生叶具长柄；叶片五角形，三全裂，各裂片再不同程度分裂，表面有疏毛，背面通常无毛。苞片3，似基生叶，不等大；萼片5，倒卵形或椭圆形，白色，蕾时外面紫红色；花丝丝状，多数，心皮约8数。

花期：4 ~ 6月。

生境：中海拔的山谷林下或水边草丛中。

分布：华东、西南、华中及西北部分省区。

观赏或其他用途：株形小巧，叶形圆润，花小巧可爱。

石龙芮

Ranunculus sceleratus

毛茛科，毛茛属。一年生草本。全株无毛。基生叶多数，叶片肾状圆形，3深裂；茎生的下部叶与基生叶同形，上部叶渐小，3全裂。聚伞花序；花小；萼片5，椭圆形，淡绿色；花瓣5，倒卵形，等长或稍长于萼片。聚合果长圆形；瘦果稍扁，喙极短。

花期：3 ~ 5月。

生境：田边、沟边、湿地或稻田中。

分布：全国各地均有分布。

观赏或其他用途：常见湿生杂草；有小毒。

女萎

Clematis apiifolia

毛茛科，铁线莲属。落叶藤本。三出复叶对生，小叶片卵形或宽卵形，常具不明显3浅裂，边缘有粗锯齿。圆锥花序多花；花直径1.5厘米；萼片4，白色，狭倒卵形。瘦果纺锤形或狭卵形，有柔毛。

花期：7 ~ 9月。

生境：海拔1000米以下的山间林中或溪边灌丛。

分布：华东地区。

观赏或其他用途：花序硕大，洁白，极富野趣的藤本植物。

绣球藤

Clematis montana

毛茛科，铁线莲属。落叶藤本。三出复叶，叶簇生于短枝上，或对生；小叶片卵形至椭圆形，边缘缺刻状粗钝锯齿，顶端3裂或不明显。花与叶簇生，直径3～5厘米；萼片4，白色或外面淡红色，长圆状倒卵形至倒卵形。瘦果扁。

花期：4～6月。

生境：中高海拔的山坡、石缝灌丛或林边、溪沟旁。

分布：华东、华中、西北、西南及华南部分省区。

观赏或其他用途：花色洁白美丽，成片开放，蔚为壮观，可栽培于庭院中观赏；茎藤可药用。

蕨叶人字果

Dichocarpum dalzielii

毛茛科，人字果属。多年生草本。叶3 ~ 11枚，全部基生，复叶，形如鸟趾状。花莛数条，复单岐聚伞花序有3 ~ 8朵花，苞片三全裂；萼片白色，倒卵状椭圆形；花瓣金黄色，瓣片近圆形，具细长爪；雄蕊多数。蓇葖果倒人字叉开，椭圆状披针形，具喙。

花期：4 ~ 5月。

生境：山地林下阴湿处。

分布：华东、华南及西南部分省区。

观赏或其他用途：株形小巧，叶形秀丽，花洁白淡雅。

偏翅唐松草

Thalictrum delavayi

毛茛科，唐松草属。多年生高大草本。全株无毛。基生叶花时枯萎。茎下部和中部叶为三至四回羽状复叶；小叶浅裂或不裂，裂片边缘或有齿；叶柄基部有鞘。圆锥花序；萼片4（5），淡紫色，卵形或狭卵形；雄蕊多数，心皮多数。瘦果扁，有时稍镰刀形弯曲。

花期：6 ~ 9月。

生境：海拔2000 ~ 3500米的山地林缘、沟边灌丛或疏林中。

分布：西南地区。

观赏或其他用途：花呈梦幻般的紫色，虽小巧却也艳丽，可栽培于庭院中观赏。

华东唐松草

Thalictrum fortunei

毛茛科，唐松草属。多年生草本。基生叶为二至三回三出复叶；小叶背面粉绿色，顶生小叶不明显三裂，侧生小叶基部斜心形；叶柄基部有短鞘，具全缘托叶。复单歧聚伞花序圆锥状；萼片4，白色或淡堇色，倒卵形；花丝多数；心皮（3）4～6。瘦果无柄，宿存花柱顶端通常拳卷。

花期：3～5月。

生境：海拔1500米以下的山地林下或阴湿处。

分布：华东地区。

观赏或其他用途：叶形圆润素雅，花色素净别致，细看如烟花般绚烂，可栽培于庭院或于花境中观赏。

天葵

Semiaquilegia adoxoides

毛茛科，天葵属。多年生草本。茎丛生，疏被毛。基生叶多数，掌状三出复叶，边缘疏生粗齿，两面无毛；茎生叶较小。花小；苞片小，倒披针形至倒卵圆形；萼片白色，常带淡紫色，狭椭圆形；花瓣匙形，比萼片短，顶端近截形。

花期：3 ~ 4月。

生境：海拔1000米以下的疏林下或路旁、山谷阴凉处。

分布：华东、华南、华中、西南各省。

观赏或其他用途：叶、花娇嫩可爱；根可作土农药。

无距耧斗菜

Aquilegia ecalcarata

毛茛科，耧斗菜属。多年生草本。茎上被稀疏白柔毛。基生叶为二回三出复叶；中央小叶三裂，裂片有数个圆齿，侧生小叶斜卵形，不等二裂。茎生叶与基生叶相似，较小。花数朵，直立或下垂，花梗纤细，被白色柔毛；萼片紫色，椭圆形；花瓣直立，椭圆形，与萼片等长，顶端近截形，无距。蓇葖果具宿存花柱。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔1500 ~ 3500米的山地林下或路旁。

分布：西北、西南、华中部分省区。

观赏或其他用途：叶形秀美，花形奇特且色彩艳丽，可栽培于花境中观赏。

三裂碱毛茛

Halerpestes tricuspis

毛茛科，碱毛茛属。多年生矮小草本。具横走匍匐茎。叶基生，质地厚，菱状楔形至宽卵形，3中裂至深裂，中裂片比侧裂片长，基部有鞘。花单生，萼片卵状长圆形；花瓣5，黄色或表面白色，狭椭圆形，具短爪；雄蕊约20。聚合果近球形；瘦果20多枚，两面具纵肋，顶上具短喙。

花期：5 ~ 8月。

生境：海拔3000 ~ 5000米的盐碱性湿草地。

分布：西北、西南部分省区。

观赏或其他用途：花、叶小巧秀气，花色鲜艳，高山盐碱性湿地常见极富野趣的小花。

黄牡丹

Paeonia delavayi var. *lutea*

毛茛科，芍药属。多年生亚灌木。小枝基部具数枚鳞片。二回三出复叶宽卵形或卵形；羽状分裂，裂片披针形至长圆状披针形。花数朵生枝顶或叶腋；苞片披针形，大小不等；萼片宽卵形，大小不等；花瓣9（12），倒卵形，黄色，有时边缘红色或基部有紫斑。蓇葖果。

花期：5月。

生境：中海拔山地林缘。

分布：云南、四川及西藏。

观赏或其他用途：花大，鲜艳美丽，种质资源十分珍贵，为栽培牡丹品种提供了宝贵的基因库；根可药用。

川赤芍

Paeonia anomala subsp. *veitchii*

毛茛科，芍药属。多年生草本。二回三出复叶宽卵形；小叶裂成羽状，裂片披针形，全缘。花数朵生茎顶及叶腋，偶单朵；苞片裂或不裂，披针形，大小不等；萼片4，宽卵形；花瓣6～9，倒卵形，紫红色或粉红色；心皮密生黄色绒毛。蓇葖果也密生绒毛。

花期：5～6月。

生境：中海拔山坡林下草丛、疏林中、路旁。

分布：西藏、四川、青海、甘肃和陕西。

观赏或其他用途：花鲜艳夺目，可栽培于庭院中观赏；根可药用。

六角莲

Dysosma pleiantha

小檗科，八角莲属。多年生草本。全株无毛。茎生叶常2片，对生，盾状，长圆形或近圆形，5 ~ 9浅裂，裂片宽三角状卵形，边缘有细齿，微反卷，有8 ~ 9射出脉。花数朵排成伞形花序生于两叶柄交叉处；花两性，下垂；萼片6，早落；花瓣6，紫红色，长圆形至倒卵状椭圆形。浆果球形或卵圆形。

花期：4 ~ 6月。

生境：海拔400 ~ 1500米的山坡沟谷林下湿润处或草丛中。

分布：浙江、安徽、福建、台湾。

观赏或其他用途：叶形硕大，形状奇特，花色艳丽，可栽培于林下观赏；根状茎可药用。

桃儿七

Sinopodophyllum hexandrum

小檗科，桃儿七属。多年生草本。茎直立，单生，基部具鳞片。叶2枚，宽大，3～5深裂几达中部，裂片有时还微小裂，上面无毛，背面被柔毛，边缘具粗齿。花单生于枝顶，粉红色；萼片6；花瓣6，倒卵形或倒卵状长圆形，先端略呈波状；雄蕊6；雌蕊1。浆果卵圆形，熟时红褐色。

花期：5～6月。

生境：海拔2000～4500米的林下、林缘湿地、灌丛或草丛中。

分布：西南及西北各省。

观赏或其他用途：叶形奇特，花色淡雅；根茎、须根及果实可入药。

三枝九叶草

Epimedium sagittatum

小檗科，淫羊藿属。多年生草本。一回三出复叶基生或茎生，小叶3；小叶革质，卵形至卵状披针形，中间小叶基部不偏斜，侧生小叶高度偏斜，叶缘具细密刺齿；花茎2枚叶对生。圆锥花序具多数花；萼片2轮，外萼片具紫色斑点，内萼片白色；花瓣囊状，淡棕黄色，先端钝圆。蒴果具宿存花柱。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔1800米以下山坡草丛、石缝、林下或水沟边。

分布：华中、华东、华南、西北部分省区及四川省。

观赏或其他用途：叶形美丽，可种于林下或岩石园观赏；全草可做强壮药。

叶缘具细密刺齿

庐山小檗

Berberis virgetorum

小檗科，小檗属。落叶灌木。节上刺单一少分叉。叶片长圆状菱形，基部下延成叶柄，叶全缘或波状，上面黄绿色，下面有白粉。花序总状或伞形；萼片2轮，内轮萼片长于外轮萼片；花瓣椭圆状倒卵形，较内轮萼片稍短，全缘，基部具长圆形腺体。浆果长圆状椭圆形，熟时红色，无宿存花柱。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔600 ~ 1500米林下或山坡灌丛中。

分布：华中、华东、华南部分省区。

观赏或其他用途：株形圆整，叶形圆润，花金黄美丽，可栽培于林缘观赏；根皮及茎皮可入药。

阔叶十大功劳

Mahonia bealei

小檗科，十大功劳属。常绿灌木。一回奇数羽状复叶，小叶7～19，厚革质，叶片卵形，叶缘具若干刺状锯齿，边缘反卷；侧生小叶无柄，顶生小叶具柄。总状花序直立于枝顶端；花黄色；具三轮萼片；花瓣6，长倒卵形，先端2裂，基部具2腺体。浆果卵形或卵圆形，熟时蓝黑色，被薄白粉。

花期：11月～翌年3月。

生境：海拔500～1500米的山坡林下阴湿处。

分布：西北、华中、华东、华南及西南部分省区。

观赏或其他用途：叶色四季浓绿，花于冬季开放，颇具观赏价值，常作林下地被；全株供药用。



大血藤

Sargentodoxa cuneata

大血藤科，大血藤属。落叶藤本。三出复叶，中央小叶不偏斜，具叶柄；侧生小叶偏斜卵形，基部不对称，无小叶柄，叶两边无毛。花单性，花序下垂；萼片线状长椭圆形，黄色，边缘稍内卷；花瓣极小，隐于萼片内；雌蕊多数，螺旋状生于突起的花托上。浆果近球形，成熟时蓝黑色，被白粉。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔300 ~ 1000米的山坡灌丛、疏林或林缘。

分布：华东、华中、华南、西南部分省区及陕西省。

观赏或其他用途：根、茎可药用，茎皮还可制绳索。

猫儿屎

Decaisnea insignis

木通科，猫儿屎属。落叶灌木。奇数羽状复叶，生于茎顶；小叶多数，对生，卵圆形或卵状椭圆形，全缘。总状花序生于叶腋，花杂性异株，下垂；花淡绿色，萼片披针形，长渐尖，成2轮；花瓣缺。果圆柱形，稍弯曲，成熟时蓝色，被白粉。

花期：5 ~ 6月。

生境：山坡及沟边阴湿林缘或林下。

分布：华东、华中、西南部分省及陕西、广西等地。

观赏或其他用途：果可鲜食，也可酿酒；根和果还可入药。

木通

Akebia quinata

木通科，木通属。落叶木质藤本。掌状复叶具5小叶；小叶倒卵形或椭圆形，先端微凹，具小尖头，全缘。总状花序；花具细长花梗；雄花紫红色，较小；雌花暗紫色，较雄花大。肉质蓇葖果浆果状，椭圆形或长椭圆形，成熟时暗紫色，常开裂。

花期：4月。

生境：山坡路旁和溪边灌丛。

分布：长江流域各省区。

观赏或其他用途：叶圆润，花美丽，形态奇特，可栽培于亭廊或假山供观赏；果味道甜美可食，茎、根和果实还可药用。

掌状5小叶，叶质地薄

钝药野木瓜（短药野木瓜）

Stauntonia leucantha

木通科，野木瓜属。常绿木质藤本。掌状复叶具5 ~ 7小叶，革质，椭圆状倒卵形或近椭圆形，全缘，上面深绿色，下面灰绿色。伞房花序；花单性，雌雄同株异序；雌花萼片6，2轮，外轮披针形，淡绿白色，内轮线形，先端淡紫红色，离心皮雌蕊3，绿色；雄花萼片与雌花相似，略小，雄蕊6。浆果状蒴荚果圆柱形，成熟时黄色。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔1000米以下的山地林中、林缘或溪边灌丛中。

分布：华东、华南、西南部分省区。

观赏或其他用途：叶四季浓绿，姿态动人，果色诱人，可做观赏藤本栽培。

罂粟科

荷青花

Hylomecon japonica

罂粟科，荷青花属。多年生草本。叶羽状全裂，裂片5～7，菱状长圆形或近椭圆形，边缘具不整齐重锯齿，有时侧方裂片锐裂。聚伞花序顶生；萼片2，狭卵形；花瓣金黄色，4枚，近圆形，基部具短瓣柄；雄蕊多数；子房长圆柱形，心皮2。蒴果细长。

花期：4～5月。

生境：海拔1000米左右山坡林下阴湿处。

分布：东北、西北、华东、华中及华南。

观赏或其他用途：花金黄艳丽，可种植于林下阴湿处观赏；根茎可入药。

血水草

Eomecon chionantha

罂粟科，血水草属。多年生草本。单叶基生，通常2 ~ 4枚；叶片卵状心形，边缘波状，上面绿色，下面具白粉，基出脉5 ~ 7。聚伞花序伞房状；萼片2，合生成船形；花瓣白色，4枚，倒卵形；雄蕊多数，花药金黄色；花柱明显，顶端2裂。蒴果长椭圆形，顶端稍细。

花期：4月。

生境：林下或林缘阴凉处。

分布：长江中下游流域及福建、广西、贵州等省。

观赏或其他用途：花洁白，花丝金黄艳丽，叶片硕大圆润，于林下栽培观赏效果好；全草有小毒。

博落回

Macleaya cordata

罂粟科，博落回属。多年生高大草本。茎光滑被白粉。单叶互生，叶片宽卵形或近圆形，7 ~ 9浅裂，边缘波状或具波状牙齿，下面被白粉及灰白色细毛。圆锥花序具多数小花；萼片2枚，黄白色或带红色；无花瓣；雄蕊多数，花丝丝状。蒴果倒披针形或倒卵形，被白粉。

花期：6 ~ 8月。

生境：低山草地、丘陵及林缘开阔地。

分布：长江中下游流域和台湾。

观赏或其他用途：株形高大显眼，叶片硕大，银白色，富有野趣，栽培于花境中观赏效果佳；根、茎、叶可入药，毒性较强，不可内服。

五脉绿绒蒿

Meconopsis quintuplinervia

罂粟科，绿绒蒿属。多年生草本。基生叶呈莲座状，叶片倒卵形至披针形，边缘全缘，叶柄及叶片两面密被黄色或棕褐色硬毛。花单生于基生花莛上，下垂；花瓣4 ~ 6，倒卵形或近圆形，淡蓝色或紫色。蒴果椭圆形或长圆状椭圆形，密被紧贴的刚毛。

花期：6 ~ 9月。

生境：海拔2000 ~ 4500米的高山草地或灌丛中。

分布：西北地区及湖北、四川、西藏等地。

观赏或其他用途：花色彩艳丽，似娇羞般下垂，甚是可爱，是高原上极富观赏性的野生花卉。

刻叶紫堇

Corydalis incisa

罂粟科，紫堇属。多年生草本。叶具长柄，基生叶叶柄基部稍膨大成鞘状；叶片羽状全裂，一回裂片2～3对，二或三回裂片不规则羽状分裂，裂片边缘具缺刻。总状花序；苞片羽状深裂；萼片2枚，边缘撕裂；花蓝紫色，瓣片边缘具小波状齿，先端微凹，距圆筒形。蒴果线形。

花期：3～4月。

生境：山坡林下、沟边草丛或路边石缝、墙角等处。

分布：华北、华中、华东、西北及台湾省。

观赏或其他用途：田间山头常见野花，可播种于林缘或林下，极富野趣；全草可药用，有毒，不能内服。

夏天无

Corydalis decumbens

别名：伏生紫堇

罂粟科，紫堇属。二年生草本。茎上具2 ~ 3枚叶。叶二回三出，小裂片全缘或深裂成裂片。总状花序。花白色、粉红色至淡蓝色。外花瓣顶端下凹，常具狭鸡冠状突起；上花瓣多少下弯；距稍短于瓣片。蒴果线形多少扭曲。

花期：3 ~ 4月。

生境：海拔400米以下的山坡或路边、田间、林缘。

分布：华中、华东及山西、台湾等省区。

观赏或其他用途：花色鲜艳美丽，可播种作野花观赏；块茎可药用。

末回小裂片全缘

蜡瓣花

Corylopsis sinensis

金缕梅科，蜡瓣花属。落叶灌木。叶薄革质，倒卵形至长倒卵形，基部不等侧心形；侧脉显著；叶边缘有锯齿，齿间刺毛状。总状花序，苞片及萼筒均有毛；花瓣匙形，金黄色。蒴果近圆球形。

花期：4 ~ 5月。

生境：山地灌丛或溪边灌丛。

分布：华中、华东、华南部分省区及贵州省。

观赏或其他用途：常成丛林状，株形紧凑，叶圆润可爱，花金黄靓丽，开放时甚为壮观，是园林中极好的春季观赏灌木。

红花荷

Rhodoleia championii

金缕梅科，红花荷属。常绿乔木。叶厚革质，卵形，三出脉，上面绿色，下面灰白色，全缘。头状花序常弯垂；具鳞状小苞片；花瓣匙形，鲜红色；雄蕊多且与花瓣等长。头状果序具若干蒴果；蒴果卵圆形。

花期：1 ~ 3月。

生境：山地常绿林中。

分布：广东、香港。

观赏或其他用途：冬季开放，花大且色彩鲜艳美丽，叶四季浓绿，耐寒性稍强，可向华东部分省区引种驯化。

檵木

Loropetalum chinense

金缕梅科，檵木属。常绿灌木或小乔木。小枝有星状毛。叶革质，卵形，基部不等，全缘，上面绿色，下面灰色且被星状毛。花数朵簇生，花梗短；苞片线形；花瓣4枚，带状，白色。蒴果卵圆形。

花期：3 ~ 4月。

生境：低海拔向阳山地和阔叶林或针叶林下。

分布：华中、华东、华南及西南各省。

观赏或其他用途：花洁白素雅，常用作红花檵木的砧木，嫁接制作各种造型盆景；叶还可止血，枝强韧，野外可用作包扎。

金缕梅

Hamamelis mollis

金缕梅科，金缕梅属。落叶灌木或小乔木。叶纸质或薄革质，阔倒卵形，基部不等侧心形；边缘有波状钝齿，下面密生星状毛。花序头状或短穗状，腋生；花瓣带状，黄白色；雄蕊4。蒴果卵圆形。

花期：1 ~ 2月。

生境：中海拔次生林或灌丛。

分布：华中、华东及四川、广西等省。

观赏或其他用途：叶形圆润美丽，花于早春开放，色彩艳丽，形态奇特，著名的早春观花灌木，国外已培育出若干观赏品种。



荨麻科

庐山楼梯草

Elatostema stewardii

荨麻科，楼梯草属。多年生草本。茎肉质，几无毛。叶草质，互生，斜椭圆形至斜长圆形，边缘中部以上具牙齿，叶上钟乳体密生，叶脉在叶两侧数量不等。花雌雄异株，单生叶腋。

花期：7 ~ 9月。

生境：海拔500 ~ 1500米的山谷沟边林下阴湿处或瀑布岩石上。

分布：华中、华东、西南部分省区。

观赏及其他用途：可栽培作林下地被观赏；全草可入药。

垂序商陆

Phytolacca americana

商陆科，商陆属。多年生高大草本。根粗壮肥大。叶片椭圆状卵形或卵状披针形，无毛，全缘。总状花序顶生或侧生，花白色带红晕，花被片5，心皮合生。果序下垂；浆果扁球形，熟时紫黑色。

花期：6 ~ 8月。

生境：城市废弃地及乡村四旁、山地、公路旁。

分布：原产北美，我国华北、华东、华中、华南及西南各省均有逸生。

观赏或其他用途：全株可药用，全草还可作农药。

青葙

Celosia argentea

苋科，青葙属。一年生草本。全株无毛。叶片披针形至披针状条形，顶端具小芒尖。花密集呈塔状或圆柱形穗状花序，顶生；苞片白色；花被片矩圆状披针形，初为白色顶端带红色，或全部粉红色，后变白色；花药紫色。果包于宿存花被片内。

花期：5 ~ 9月。

生境：海拔1000米以下的平原、田边、丘陵、山坡及水边。

分布：全国基本都有分布。

观赏或其他用途：花素雅可爱，做干花长时间不凋；嫩茎叶可食；全草可作饲料；种子可药用。

剪秋罗

Lychnis senno

石竹科，剪秋罗属。多年生草本。全株被柔毛。叶对生，卵状披针形或卵状长圆形，基部圆，全缘，叶两面及边缘均被粗毛。二岐聚伞花序紧缩呈伞房状；花萼筒棒形，萼齿三角状；花瓣5，深红色，瓣片深2裂达中部，裂片顶端具不明显细齿。蒴果长圆形。

花期：6 ~ 9月。

生境：山间疏林下、灌丛中及草甸阴湿处。

分布：长江流域各省。

观赏或其他用途：花色鲜艳美丽，栽培于花境或林缘观赏效果极佳。

雀舌草

Stellaria alsine

石竹科，繁缕属。二年生草本。茎铺散状丛生。叶无柄，披针形至长圆状披针形，基部半抱茎，全缘呈波状。花单生叶腋或聚伞花序顶生；萼片5，披针形；花瓣5，白色，2深裂几达基部；花柱3（有时2）。蒴果卵圆形。

花期：5 ~ 6月。

生境：田间、溪边或潮湿地。

分布：全国大部省区均有分布。

观赏或其他用途：常见田间杂草；全株可药用。

蝇子草

Silene fortunei

别名：鹤草

石竹科，蝇子草属。多年生草本。茎上部分泌黏液。基生叶片匙状披针形，茎生叶对生，线状披针形，均全缘。聚伞花序顶生；花粉红色或白色；萼筒细长管状，光滑，具10条纵脉；花瓣5，先端2深裂，裂片再分裂成细裂片。蒴果长圆形。

花期：7～8月。

生境：山坡草丛、溪边或林缘。

分布：长江流域、黄河中下游南部及福建、台湾。

观赏或其他用途：花素雅美丽，可种植于花境中或播种作野花观赏；根可入药。

繁缕

Stellaria media

石竹科，繁缕属。一年生或二年生草本。叶对生，宽卵形或卵形，基部渐狭或近心形，全缘；基生叶具长柄。聚伞花序顶生；萼片5，卵状披针形；花瓣白色，长椭圆形，比萼片短，深2裂达基部；花柱3。蒴果卵形。

花期：6 ~ 7月。

生境：田间、山坡及溪边。

分布：除新疆、黑龙江外全国均分布。

观赏或其他用途：常见杂草，嫩苗可作蔬菜食用；茎、叶及种子可供药用。

孩儿参

Pseudostellaria heterophylla

石竹科，孩儿参属。多年生草本。块根纺锤形，白色。叶对生；下部叶片倒披针形，基部渐狭成柄状；上部叶宽卵形或菱状卵形；叶均为全缘。开放受精花1～3朵，具长梗，腋生或呈聚伞状；萼片5，狭披针形；花瓣5，白色，长圆形或倒卵形，顶端2浅裂；闭花受精花具短梗。蒴果宽卵形。

花期：4～7月。

生境：中高海拔的山谷林下。

分布：华北、西北、华中、华东及四川、辽宁等省。

观赏或其他用途：株形小巧可爱，花色洁白淡雅，成片开放时美丽；块根是著名中药，为滋补强壮剂。

红蓼

Polygonum orientale

蓼科，蓼属。一年生高大草本。茎上部密被开展长柔毛。叶宽卵形至卵状披针形，边缘全缘，密生缘毛；托叶鞘筒状，被长缘毛，通常沿顶端具绿色翅。总状花序穗状，顶生或腋生，花序下垂；花被5深裂，淡红色或白色。

花期：6 ~ 9月。

生境：村庄路边、溪沟边。

分布：除西藏外全国各地广布。

观赏或其他用途：花序大而壮观，色彩鲜艳，可栽培于花境中观赏，自播能力强；种子可入药。

头花蓼

Polygonum capitatum

蓼科，蓼属。多年生草本。茎匍匐，节上生根。叶卵形或椭圆形，全缘，上面常有黑褐色斑点；托叶鞘筒状，顶端截形，有缘毛。头状花序顶生；花序梗具腺毛；花被5，深裂，淡红色。瘦果卵形，具3棱。

花期：6 ~ 10月。

生境：山坡、山谷湿地、山间路边及石缝中。

分布：华东、华中、西南、华南各省区。

观赏或其他用途：花序圆形，密集，形色俱佳，耐旱性强，于山林或石缝中开放时颇有趣味；全草可入药。

刺蓼

Polygonum senticosum

蓼科，蓼属。多年生蔓性草本。植株营养体均分布有倒生小钩刺。茎四棱。叶互生；叶片三角形或三角状戟形；托叶鞘下部筒状，上部扩大成肾圆形叶状翅。头状花序顶生或腋生；花被粉红色，5深裂。瘦果近圆球形。

花期：8 ~ 10月。

生境：沟边、路旁草丛、山谷灌丛等阴湿处。

分布：华东、华北、华南各省及辽宁均有分布。

观赏或其他用途：于山野间林下阴湿处点缀其间，富有野趣；全草可入药。

掌叶大黄

Rheum palmatum

蓼科，大黄属。多年生高大粗壮草本。茎直立中空。叶片硕大，可达60厘米，通常掌状5裂至中部，每一裂片再裂，基出脉5；茎生叶渐小；托叶鞘大。大型圆锥花序顶生；花小，通常紫红色，有时黄白色；花被片6。果实矩圆状椭圆形至矩圆形。

花期：6 ~ 7月。

生境：中高海拔的山坡或山谷湿地。

分布：西南及西北部分省区。

观赏或其他用途：株形硕大，成片时场面蔚为壮观，可栽植于花境中观赏；根状茎及根供药用，西北常有栽培。

叶大，掌状5裂至中部

羊蹄

Rumex japonicus

蓼科，酸模属。多年生草本。基生叶长圆形或披针状长圆形，基部圆形或心形，边缘微波状；茎上部叶狭长圆形；托叶鞘膜质。花序圆锥状，多花轮生；花被片6，淡绿色。瘦果宽卵形，具3锐棱。

花期：5 ~ 6月。

生境：田边路旁、河滩、沟边湿地等处。

分布：全国除新疆、西藏、云南等少数几个省外均有分布。

观赏或其他用途：株形高大，嫩茎有酸味，可食用；根可入药。

两栖蓼

Polygonum amphibium

蓼科，蓼属。多年生水生草本。生于水中：茎漂浮，节部生不定根。叶长圆形或椭圆形，浮于水面，两面无毛，全缘。生于陆地：茎直立，叶披针形或长圆状披针形，全缘，两面被短硬伏毛。两种形态叶的托叶鞘均为筒状，顶端截形。总状花序穗状，顶生或腋生；花被5深裂，淡红色或白色。瘦果近圆形。

花期：7 ~ 8月。

生境：湖泊边缘浅水中、溪沟边及田边湿地。

分布：东北、华北、西北、华东、华中和西南各省区。

观赏或其他用途：叶形奇特，花美丽可爱，可栽培于湿地浅水或沼泽地供观赏。

金荞麦

Fagopyrum dibotrys

蓼科，荞麦属。多年生草本。茎具纵棱。叶三角形，基部近戟形，边缘全缘；托叶鞘筒状，膜质，偏斜，顶端截形，无缘毛。花序伞房状，顶生或腋生；花被5深裂，白色，花柱3。瘦果宽卵形，具3锐棱。

花期：7 ~ 10月。

生境：山谷湿地或山坡、溪沟边灌丛中。

分布：华东、华中、华南、西南及陕西等省。

观赏或其他用途：花序洁白淡雅，丛生植株较为紧凑，观叶观花俱可，可栽培于花境中或溪沟边观赏；块根供药用；种子可酿酒。

毛柄连蕊茶

Camellia fraterna

山茶科，山茶属。常绿灌木。小枝及芽密被毛。叶片椭圆形至椭圆状披针形，边缘有锯齿，上面沿中脉密被毛，常污黑色。花1～2朵顶生兼腋生，白色或带少许红晕，有芳香；花梗常为覆瓦状苞片覆盖；萼片5；花瓣5～6，基部连生；里面3片大于外面的。蒴果近球形。

花期：2～3月。

生境：海拔1000米以下的山坡、溪边沟谷或常绿林中常见。

分布：华东各省山区。

观赏及其他用途：花于初春开放，开放时满树洁白，甚为喧闹。



紫茎

Stewartia sinensis

山茶科，紫茎属。落叶小乔木。树皮灰黄色或灰色，片状剥落。叶长圆状椭圆形至倒卵状椭圆形，边缘有疏锯齿或浅圆锯齿。花单生叶腋；苞片2，卵形至卵状长椭圆形；萼片与苞片同形；花瓣不相等，宽倒卵形，先端圆形；雄蕊多数，1/3处合生。蒴果圆锥形，具5棱，顶端具喙。

花期：5 ~ 6月。

生境：海拔500 ~ 1500米的山坡或溪沟旁林中。

分布：安徽、浙江、江西、湖北、湖南及四川。

观赏或其他用途：树干斑驳美丽，花大且色泽美丽，是初夏时分极好的观赏植物。

格药柃

Eurya muricata

山茶科，柃木属。常绿灌木。嫩枝圆柱形，多少具棱，枝及冬芽均无毛。叶革质，互生，椭圆形或长圆状椭圆形，边缘具浅细锯齿。花腋生；花瓣倒卵形，白色或黄白色。果实圆球形。

花期：10 ~ 12月。

生境：海拔1000米以下山坡、山谷溪边及路旁灌丛。

分布：华东、华中部分省及广州、四川、贵州。

观赏或其他用途：花于冬季开放，是冬季重要的蜜源植物；树皮可提制栲胶。

中华猕猴桃

Actinidia chinensis

猕猴桃科，猕猴桃属。落叶木质藤本。雌雄异株。叶互生，宽卵形至椭圆形，先端微凹或截平，边缘具刺毛状小齿，叶下面及叶柄密被绒毛。聚伞花序生于当年生枝叶腋；雄花多为3，雌花多单生；花初放时白色，后变淡黄；萼片5；花瓣5，宽倒卵形。果圆球形至长圆状球形。

花期：5 ~ 6月。

生境：海拔1500米以下的向阳山坡或山沟旁、林下或灌丛中。

分布：长江流域以南各省、区。

观赏或其他用途：果富含维生素，具有极高营养价值的水果；根还可入药。

黄牛木

Cratoxylum cochinchinense

藤黄科，黄牛木属。落叶灌木或小乔木。全体无毛，枝叶对生。叶椭圆形至披针形，全缘，两面无毛，侧脉及细脉两面凸起。聚伞花序腋生或顶生；萼片椭圆形，有黑色纵腺条，果时增大；花瓣基部无鳞片；花瓣粉红、深红至红黄色，倒卵形，先端圆形。雄蕊束3。蒴果椭圆形。

花期：4 ~ 5月。

生境：低山地或丘陵的干燥向阳山坡上的次生林或灌丛中。

分布：广东、广西、云南。

观赏或其他用途：花色鲜艳美丽，可栽培观赏；木材可供雕刻用；根、树皮及嫩叶可入药；嫩叶还可制茶。

梧桐科

马松子

Melochia corchorifolia

梧桐科，马松子属。一年生灌木状草本。叶片卵形或披针形，边缘有锯齿，基出脉3条；托叶线形。花密集成聚伞花序或团伞花序生枝顶或腋生；小苞片线形；花萼钟状，5浅裂；花瓣5，白色或淡红色，匙形或长圆形。蒴果圆球形，具5棱。

花期：7 ~ 9月。

生境：低海拔田野、山坡、路旁草丛中。

分布：长江以南各省区。

观赏或其他用途：常见野花；茎皮纤维可编织用。

梵天花

Urena procumbens

锦葵科，梵天花属。落叶灌木。小枝密被星状绒毛。茎下部叶圆卵形，上部叶菱状卵形或卵形，叶通常掌状3～5深裂，裂至中部以下，有时叶不裂，边缘具锯齿。花单生或簇生于叶腋；花萼钟状，裂片卵形；花冠淡红色，花瓣倒卵形；雄蕊柱无毛。果扁球形，分果瓣被锚状钩刺和长硬毛。

花期：7～11月。

生境：低山丘陵的山坡灌丛、路边、溪沟边和村庄附近空地上。

分布：华东、华南大部省区。

观赏或其他用途：花红艳可爱，常成片生长，开放时满目桃红色，可栽培观赏；根、叶可入药。

圆叶茅膏菜

Drosera rotundifolia

茅膏菜科，茅膏菜属。多年生食虫草本。叶基生，具长柄；叶圆形或扁圆形，叶缘具黏腺毛，叶正面腺毛短，背面无毛。聚伞花序腋生，花莛纤细；花梗被腺毛或近无毛；花萼5裂，下部合生，裂片卵形或狭卵形；花瓣白色，偶有粉红色，5枚，匙形。蒴果。

花期：6 ~ 10月。

生境：山坡、林缘、路边湿草丛或岩石上。

分布：福建、广东、湖南、江西、吉林、黑龙江、浙江。

观赏或其他用途：植株小巧玲珑，能用叶片上的腺毛捕捉小动物以供植株的营养，可置于小容器内观赏。



七星莲

Viola diffusa

堇菜科，堇菜属。一年生草本。全株被糙毛或白色柔毛，花期有地上匍匐茎。茎生叶莲座状，在匍匐枝上互生；叶片卵形或卵状长圆形，基部明显下延于叶柄，边缘具钝齿。托叶大部与叶柄离生，线状披针形，边缘具稀疏齿；花淡紫色或浅黄色，生于叶腋；萼片附属物短；距极短，稍露出萼片附属物外。蒴果长圆形。

花期：3 ~ 5月。

生境：林下、林缘、草坡、溪沟边及岩石缝隙中。

分布：长江以南各省区。

观赏或其他用途：株形小巧，花色淡雅，形态可爱，颇具小清新的小野花；全草可药用。

紫花地丁

Viola philippica

堇菜科，堇菜属。多年生草本。叶基生为莲座状，三角状卵形至长圆状卵形，边缘具平缓圆齿；托叶大部与叶柄合生，离生部分线状披针形，边缘疏生具腺体的流苏状细齿或全缘。花紫堇色或淡紫色，稀白色，喉部具紫纹；萼片基部附属物短；花瓣倒卵形或长圆状倒卵形；距细管状，末端圆。蒴果长圆形。

花期：4 ~ 8月。

生境：田头、荒地、山坡草丛或林缘中。

分布：全国大部省区均有分布。

观赏或其他用途：花色鲜艳美丽，常大片开放于草丛中，优良的早春观赏野花；全草可入药；嫩叶可食用。

南山堇菜

Viola chaerophylloides

堇菜科，堇菜属。多年生草本。基生叶3全裂，裂片再深裂，细裂片形状大小各异，边缘具缺刻状齿或裂。托叶1/2以上与叶柄合生，边缘具稀疏细齿或全缘。花白色、乳白色或淡紫色；萼片基部附属物发达，末端具不整齐缺刻或裂；花瓣宽倒卵形；距长而粗，直或稍下弯。蒴果长椭圆状。

花期：4 ~ 6月。

生境：海拔1600米以下山地阔叶林下或林缘、溪谷边阴湿岩石上及草坡上。

分布：全国大部省区有分布。

观赏或其他用途：花色素雅，叶形纤细秀丽，山区岩石或空地上极好的点缀物，也可盆栽观赏。

双花堇菜

Viola biflora

堇菜科，堇菜属。多年生草本。地上茎细弱。基生叶数枚，叶片肾形至近圆形，边缘具钝齿；茎生叶稍小；托叶与叶柄离生，全缘或疏生细齿。花黄色或淡黄色；萼片线状披针形或披针形，基部附属物极短；花瓣长圆状倒卵形，具紫色脉纹；距短筒状。蒴果长圆状卵形。

花期：5 ~ 7月。

生境：海拔2500 ~ 4000米山地草甸、灌丛、林缘或岩石缝间。

分布：东北、华北、西北、西南部分省区及河南、台湾等地。

观赏或其他用途：花黄艳亮丽，点缀于山野草丛中十分显眼；全草还可药用。

王瓜

Trichosanthes cucumeroides

葫芦科，栝楼属。多年生攀援草本。卷须2歧。叶宽卵形或圆形，3 ~ 5裂或不裂，边缘具细齿或波状齿，两面被毛，基出脉5 ~ 7。花单性异株。花萼筒喇叭形，5裂，裂片线状披针形；花冠白色，裂片刚毛状；雄花单生或组成总状花序，雄蕊3，雌蕊退化成刚毛状；雌花单生，子房长圆形，密被短毛。果椭圆形至球形。

花期：5 ~ 8月。

生境：山坡、溪沟边疏林或林缘、路边草丛中。

分布：华东、华中、华南和西南。

观赏或其他用途：花形独特，果色鲜艳；果实、种子及根药用。

绞股蓝

Gynostemma pentaphyllum

葫芦科，绞股蓝属。多年生草质藤本。卷须常2歧或不分叉。鸟足状复叶具3 ~ 9小叶；小叶片卵状长圆形或披针形，中央小叶较侧生小叶稍大；叶边缘具波状齿或圆齿，两面疏被毛。花单性异株。花组成圆锥花序，雄花花序较雌花花序长。花萼筒5裂，裂片三角形；花冠淡绿色或白色，5深裂，裂片边缘具小齿；雄花具雄蕊5，合生成柱；雌花子房球形。

花期：7 ~ 9月。

生境：山坡疏林、灌丛上或路旁草丛中。

分布：长江以南各省区。

观赏或其他用途：常成片覆盖在岩石上或悬挂于灌丛上，可用作立体绿化；全草可入药，被誉为“南方人参”。

裂叶秋海棠

Begonia palmata

秋海棠科，秋海棠属。多年生草本。茎生叶互生；斜卵形或偏圆形，两侧不等，掌状3～7裂，裂片形状和深浅变化大，裂片再浅裂；叶边缘有稀疏的极浅三角形齿。2～3回二歧聚伞状花序，雌雄同株；花玫瑰色、白色或粉红色；苞片大且被毛；雄花花被片4；雌花花被片4～5，子房长圆倒卵形，花柱基部合生，柱头2裂。

花期：7～8月。

生境：山坡溪沟边灌丛、阔叶林下阴湿处。

分布：华南、华中、西南及台湾省。

用途：叶形宽大美丽，花色鲜艳，观花观叶俱佳。

中华秋海棠

Begonia grandis subsp. *sinensis*

秋海棠科，秋海棠属。多年生草本。叶互生，叶腋间常生珠芽；叶卵形，基部偏心形，边缘具重尖齿。聚伞花序生上部叶腋；花淡红色；雄花花被片4，雄蕊多数，花丝基部合生成柱；雌花较雄花稍小，花被片通常5，花柱3，柱头叉裂，裂片螺旋状扭曲。蒴果近三角形，具3翅。

花期：8 ~ 9月。

生境：山地阴湿的林下或岩石下。

分布：长江流域各省区以及河北、陕西、山西。

观赏或其他用途：植株及叶片美丽，花鲜艳，盆栽或种于岩石园中观赏效果好；块茎可药用。

鱼木

Crateva formosensis

山柑科，鱼木属。落叶灌木或小乔木。掌状复叶有3小叶，互生；侧生小叶基部偏斜。总状或伞房花序生新枝顶；花大，白色，后期转浅黄色；萼片4，远比花瓣短小；花瓣4，具爪；雄蕊多数。浆果球形或椭圆形。

花期：6 ~ 7月。

生境：低海拔山地沟谷或平地、水边或石山密林中。

分布：华南及四川省。

观赏或其他用途：花大，花时满树繁花，甚为热闹，做行道树或植于林缘、水边观赏都可。

菥蓂

Thlaspi arvense

十字花科，菥蓂属。一年生草本。茎上具棱。基生叶倒卵状长圆形，基部抱茎，边缘具疏齿。总状花序顶生；花白色；萼片卵形；花瓣长圆状倒卵形，顶端圆钝或微凹。短角果倒卵形或近圆形，顶端凹入，边缘具翅。

花期：3 ~ 5月。

生境：路旁、沟边或村庄四旁。

分布：全国大部省区有分布。

观赏或其他用途：种子可榨油；嫩苗可食用；全草可药用。

大叶碎米荠

Cardamine macrophylla

十字花科，碎米荠属。多年生草本。茎生叶4 ~ 5，羽状复叶，小叶4 ~ 5对，小叶椭圆形或卵状披针形；边缘具较整齐或钝或锐锯齿；叶正面无毛，下面散生短毛，有时两面均无毛。总状花序；萼片2轮；花瓣淡紫色或紫红色，偶白色，倒卵形，顶端圆或微凹。长角果扁平。

花期：5 ~ 6月。

生境：中高海拔的山坡林下、溪沟边、草坡湿润处。

分布：华北、西北、西南各省区。

观赏或其他用途：植株壮实，花色美丽，中高海拔常见野花，可栽培于湿地观赏；嫩苗可食用；全草可药用。

匍匐南芥

Arabis flagellosa

十字花科，南芥属。多年生草本。茎基部常生匍匐茎，茎与叶密被毛。基生叶倒卵形至匙形，边缘具浅齿，基部下延；茎生叶倒卵形至长椭圆形，向下渐小，边缘全缘或具疏齿。总状花序顶生；萼片卵形至长圆形；4片花瓣洁白，长椭圆形或匙形。长角果线形。

花期：2 ~ 4月。

生境：阴湿的溪沟边、山谷岩石缝中。

分布：安徽、浙江、江苏。

观赏或其他用途：早春开花，花色洁白，耐阴湿，可点缀于岩石园的阴湿石缝中；全草可药用。

茎基部常生匍匐茎

豆瓣菜

Nasturtium officinale

十字花科，豆瓣菜属。多年生水生草本。全株光滑无毛。奇数羽状复叶，小叶片3 ~ 9枚，宽卵形至近圆形，顶端小叶较大，小叶近全缘或浅波状，侧生小叶基部成耳状略抱茎。总状花序顶生；萼片长卵形；4枚花瓣白色，倒卵形或宽匙形，具脉纹，基部渐狭成细爪。长角果圆柱形。

花期：4 ~ 5月。

生境：池塘或水沟中、山涧、沼泽地或水田中。

分布：全国大部省区都有分布或栽培。

观赏或其他用途：可栽培做水生植物观赏；嫩茎叶可制作可口蔬菜；全草还可药用。

云南山蔊菜

Eutrema yunnanense

十字花科，山蔊菜属。多年生草本。常有匍匐茎。基生叶近圆形，边缘具波状齿；茎生叶向上渐小，长卵形或卵状三角形，边缘有波状齿或锯齿。花序呈伞房状；萼片卵形；花瓣白色，长圆形，有短爪。角果长圆筒状。

花期：3 ~ 5月。

生境：林下或山坡草丛、阴湿沟边或水中。

分布：西北、华中、华东及西南的部分省区。

观赏或其他用途：叶圆润，花色洁白，素雅美丽；嫩茎叶可作野菜。

常有匍匐茎

吊钟花

Enkianthus quinqueflorus

杜鹃花科，吊钟花属。落叶灌木或小乔木。叶集生枝顶，长圆形或倒卵状长圆形，边缘反卷，全缘偶顶部有疏细齿；脉络清晰。伞房花序生枝顶，苞片大；花萼5裂，裂片三角状披针形；花冠宽钟形，粉红色或红色，肉质，5浅裂，裂片反卷；雄蕊10。蒴果椭圆形，具5棱。

花期：1 ~ 4月。

生境：海拔600 ~ 2500米的山坡灌丛中。

分布：华东、华中、华南、西南的部分省区。

观赏或其他用途：春节期间满树小灯笼状的小花缀满枝头，为喜庆的节日增添了热闹氛围，为极佳的年宵花。

宽叶杜香

Ledum palustre var. *dilatatum*

杜鹃花科，杜香属。常绿灌木。叶线状披针形或狭长圆形，叶缘稍反卷，下面被锈色毛和白色柔毛，锈色毛后脱落。伞形总状花序顶生；花萼5齿；花冠白色，5深裂，裂片长卵形；雄蕊10；花柱宿存。蒴果卵形。

花期：6 ~ 7月。

生境：东北山区针叶林下、林边、湿草地或沼泽地里。

分布：黑龙江、吉林、内蒙古。

观赏或其他用途：在大兴安岭地区常形成大面积优势种群落，开花时洁白一片，蔚为壮观；全株可提芳香油。

满山红

Rhododendron mariesii

杜鹃花科，杜鹃花属。落叶灌木。叶常数枚集生枝顶，椭圆形至三角状卵形，边缘微反卷，全缘。花通常2朵顶生，先花后叶；花萼环状，5浅裂；花冠漏斗状，紫红色，裂片5深裂，上方裂片具紫红斑点；雄蕊8～10，不等长，比花冠短或等长。蒴果椭圆状卵球形。

花期：4～5月。

生境：海拔1500米以下山地稀疏灌丛、林缘或次生林中。

分布：华东、华中、华南、西南各省及河北、陕西、河南省。

观赏或其他用途：株形饱满，花色艳丽，于清明节期间成片开放，极为美丽。



马银花

Rhododendron ovatum

杜鹃花科，杜鹃花属。常绿灌木或小乔木。叶革质，卵形或椭圆状卵形，全缘。花芽圆锥状。花单生枝顶叶腋；花萼5深裂，裂片卵形或长卵形；花冠淡紫色、紫色或粉红色，辐状，5深裂，内面具粉红色斑点；雄蕊5，不等长，比花冠稍短。蒴果阔卵球形。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔1000米以下山坡灌丛或溪边沟谷。

分布：华中、华东、华南、西南部分省区。

观赏或其他用途：叶四季浓绿，花繁茂，色彩鲜艳，适应低海拔环境，是值得开发的杜鹃花种类；根还可药用。

云锦杜鹃

Rhododendron fortunei

杜鹃花科，杜鹃花属。常绿灌木或小乔木。叶厚革质，长圆形至长圆状椭圆形，全缘，边缘稍反卷，叶基圆形或截形，稀近浅心形。总状花序顶生，有香味；花萼短小，边缘具浅裂片7；花冠漏斗状钟形，粉红色，裂片7，阔卵形；雄蕊14，不等长。蒴果长圆状卵形至长圆状椭圆形。

花期：5 ~ 6月。

生境：海拔600 ~ 2000米的山坡向阳处或矮林中。

分布：华中、华东、华南、西南及陕西、河南等省区。

观赏及用途：叶形大且浓绿鲜亮，四季常绿，花硕大，色彩美丽，开放时十分壮观；根、叶、花可入药。

马缨杜鹃

Rhododendron delavayi

杜鹃花科，杜鹃花属。常绿乔木。树皮片状剥落。叶革质，长圆状披针形，边缘翻卷，全缘，上面无毛，下面被海绵状毛。伞形花序顶生，紧密；花萼小，裂片5，宽三角形；花冠钟形，肉质，深红色，裂片5，裂片顶端有缺刻；雄蕊10，不等长。蒴果圆柱形。

花期：4 ~ 5月。

生境：海拔1200 ~ 3200米的常绿阔叶林、山坡草地上。

分布：西南各省区及广西地区。

观赏及其他用途：株形高大，花极为红艳美丽，在西南山区常有分布，成片开放时极为壮观。

陕西杜鹃

Rhododendron purdomii

杜鹃花科，杜鹃花属。常绿灌木或小乔木。叶革质，长圆状披针形或长圆形，先端钝圆且具突尖，边缘反卷，表面暗绿色具光泽，无毛，背面淡绿色，无毛，网脉明显。短总状伞形花序顶生；花萼5裂，裂片宽三角形；花冠钟状，淡粉红色或近白色，5裂，裂片圆形；雄蕊10枚，不外露，花丝下部被白色柔毛。蒴果圆柱形，微弯曲。

花期：4 ~ 6月。

生境：海拔1800 ~ 3500米左右的山坡及山顶。

分布：陕西省、甘肃、河南。

观赏及其他用途：在陕西秦岭常于高山中成片丛生，盛花期时如花毯一般布满整个山坡，十分壮观。

红棕杜鹃

Rhododendron rubiginosum

杜鹃花科，杜鹃花属。常绿灌木或小乔木。叶通常向下倾斜，椭圆形至长圆状卵形，上面鳞片后期渐疏，下面密被锈红色鳞片，鳞片大小不等。伞形花序顶生；花萼短小，边缘状或5浅裂；花冠宽漏斗状，紫红色、淡红色或少有白色带紫晕，内有紫红色或红色斑点。蒴果长圆形。

花期：3 ~ 6月。

生境：海拔2500 ~ 4000米针叶林、针阔混交林的林缘或林间空隙。

分布：四川、云南、西藏。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，叶背面红棕色，十分艳丽。

毛果珍珠花

Lyonia ovalifolia var. *hebecarpa*

杜鹃花科，珍珠花属。落叶灌木或小乔木。叶卵状长圆形至卵形，全缘，网脉明显。总状花序腋生，基部常有数小叶；花萼裂片卵状三角形；花冠白色，椭圆状坛形，5浅裂；雄蕊10，花丝短，顶端有芒状附属物。蒴果近球形。

花期：5 ~ 7月。

生境：海拔1500米以下山坡、山谷林中或路旁灌丛、山脊上。

分布：华东、华中、华南、西南大部省区及陕西省。

观赏及其他用途：花小巧精致，洁白可爱，开放时垂满枝头；根及叶可入药。

花冠坛形，5浅裂

江南越橘

Vaccinium mandarinorum

杜鹃花科，越橘属。常绿灌木或小乔木。叶卵形或长圆状披针形，边缘有细锯齿，两面无毛或正面中脉微被毛。总状花序腋生和生枝顶叶腋；小苞片2枚，线状披针形或卵形；萼筒光滑，萼齿三角形至半圆形；花瓣白色或带淡红色，筒状或筒状坛形。浆果球形。

花期：4 ~ 6月。

生境：中低海拔的山坡灌丛或杂木林、林缘。

分布：华中、华东、华南及西南大部省区。

观赏及其他用途：花色洁白，形态小巧可爱，可作绿篱栽培观赏；果、叶可入药；果可食用。

独丽花

Moneses uniflora

鹿蹄草科，独丽花属。常绿矮小半灌木。叶对生或近轮生于茎基部，圆卵形或近圆形，边缘有锯齿。花莛具狭翅，生有鳞片状叶，卵形。花单生，花冠碟状，下垂，白色，具芳香；萼片卵圆形或卵状椭圆形，远比花瓣短；花瓣5，卵形，白色或粉红色；雄蕊10；花柱显著，柱头5裂。蒴果近球形。

花期：7 ~ 8月。

生境：海拔1000 ~ 4000米山地暗针叶林下阴湿处布满苔藓的肥沃土壤中。

分布：东北、西南、西北及台湾、山西省。

观赏及其他用途：株形小巧玲珑，花色淡雅，极为精致的小型植物。

水晶兰

Monotropa uniflora

鹿蹄草科，水晶兰属。多年生腐生草本。茎单一不分枝，全株白色而无叶绿素。叶鳞片状，互生，长圆形至宽披针形，近全缘。花单一，顶生，早期下垂，后期直立，花冠筒状钟形；花瓣5～6，楔形或倒卵状长圆形，具不整齐齿；柱头膨大呈漏斗状。蒴果椭圆状球形，直立向上。

花期：8～9月。

生境：山地林下深厚腐殖土处。

分布：西北、华东、华中、西南及台湾省。

观赏及其他用途：植株洁白无瑕，晶莹剔透，极为可爱美丽。

红花岩梅

Diapensia purpurea

岩梅科，岩梅属。常绿垫状半灌木。分枝多且密。叶密生于茎上，匙状椭圆形或匙状长圆形，基部下延于叶柄，全缘，反卷；叶柄下部膨大包茎。花单生枝顶；萼片5，匙形或长圆形；花冠圆筒形，蔷薇紫色稀粉红色，檐部5裂，裂片卵圆形，常有5条不明显脉纹。蒴果圆球形。

花期：6 ~ 7月。

生境：中高海拔的山顶或荒坡岩石壁上。

分布：云南、四川。

观赏及其他用途：附着于高山冰冷岩石上，恰似覆上了毯子，开花时更为鲜艳夺目。

玉铃花

Styrax obassia

安息香科，安息香属。落叶小乔木。少数叶于小枝最上部互生，宽椭圆形或近圆形，边缘具粗锯齿，下面密被白色星状绒毛。总状花序顶生或腋生，花白色偶粉红色，芳香；花萼杯状，萼齿三角形或披针形；花冠裂片椭圆形，外面密被毛。果实卵形或近圆形。

花期：5 ~ 7月。

生境：海拔600 ~ 1500米土壤肥沃的向阳山坡或山顶上。

分布：辽宁、山东、湖北、江西、安徽、浙江等省有分布。

观赏及其他用途：花序粗壮，花色洁白素雅，芳香四溢，是最耐寒的安息香属植物，值得推广的优良园林树种；材质优良。

白花龙

Styrax faberi

安息香科，安息香属。灌木或小乔木。叶互生，纸质，椭圆形、倒卵形或长圆状披针形，边缘具细锯齿。总状花序顶生，有花3 ~ 5朵；花白色，花后常向下弯；花萼杯状，外面密被灰黄色星状绒毛和星状短柔毛。果实倒卵形或近球形。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔100 ~ 600米低山区和丘陵地灌丛中。

分布：华东、华中、华南、西南等地。

观赏及其他用途：可栽培作观花灌木；种子榨油可制肥皂和润滑油。

赤杨叶

Alniphyllum fortunei

安息香科，赤杨叶属。乔木，高15 ~ 20米，树干通直，树皮灰褐色，有不规则细纵皱纹。叶椭圆形、宽椭圆形或倒卵状椭圆形，边缘具疏离硬质锯齿。总状花序或圆锥花序，顶生或腋生；花白色或粉红色，雄蕊10枚，5枚较花冠稍长。果成熟时5瓣开裂。

花期：4 ~ 7月。

生境：生于海拔200 ~ 2200米的常绿阔叶林中。

分布：华东、华中、华南、西南等地

观赏及其他用途：木材材质轻软，易加工，为美观轻工木材；生长速度快，也是优良的观花乔木。

小叶白辛树

Pterostyrax corymbosus

安息香科，白辛树属。乔木，高达15米。叶纸质，倒卵形、宽倒卵形或椭圆形，顶端急渐尖或急尖，边缘有锐尖的锯齿。花白色，长约10毫米；花梗极短，花冠裂片长圆形，近基部合生；花蕾时作覆瓦状排列；雄蕊10枚，5长5短。果实倒卵形，5翅，密被星状茸毛。

花期：3 ~ 4月。

生境：生于海拔400 ~ 1600米的山区河边以及山坡低凹而湿润的地方。

分布：华东、华中、华南等地。

观赏及其他用途：本种生长迅速，花繁茂且洁白美丽，可利用作为河流两岸景观树种。

白檀

Symplocos paniculata

山矾科，山矾属。落叶灌木或小乔木。叶膜质或薄纸质，阔倒卵形、椭圆状倒卵形或卵形，先端急尖或渐尖，基部阔楔形或近圆形，边缘有细尖锯齿。圆锥花序长5 ~ 8厘米；花冠白色，长4 ~ 5毫米，5深裂几达基部；雄蕊40 ~ 60枚，子房2室。核果熟时蓝黑色，卵状球形，稍偏斜。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔760 ~ 2500米的山坡、路边、疏林或密林中。

分布：产东北、华北、华东、华中、华南、西南各地。

观赏及其他用途：可用作观果灌木；根、叶可入药。

落地梅

Lysimachia paridiformis

报春花科，珍珠菜属。多年生草本，全株无毛。茎直立，单生或丛生，不分枝。叶4 ~ 6片轮生茎端，叶片倒卵形至椭圆形，全缘。花冠黄色，5深裂；花较大，12 ~ 14毫米；花梗长达1 ~ 2厘米。蒴果近球形。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔200 ~ 1400米的林下和阴湿沟边。

分布：西南、华南及湖南等省。

观赏及其他用途：花色艳丽，株形美观，可作为林下地被植物；全草可入药。

临时救（聚花过路黄）

Lysimachia congestiflora

报春花科，珍珠菜属。多年生草本。茎细弱蔓生，逐节生根。叶对生，叶片卵形、阔卵形至近圆形，近等大。花2～4朵集生茎端和枝端成近头状的总状花序，花梗极短或长至2毫米；花冠黄色，内面基部紫红色。蒴果球形，直径3～4毫米。

花期：5～6月。

生境：生于水沟边、田埂上和山坡林缘、草地等湿润处，垂直分布上限可达海拔2100米。

分布：我国长江以南各省区以及陕西、甘肃南部和台湾省。

观赏及其他用途：花鲜黄亮丽，可栽培作地被观赏；全草可入药。

狼尾花

Lysimachia barystachys

报春花科，珍珠菜属。多年生草本，株高30 ~ 100厘米。叶互生或近对生，长圆状披针形、倒披针形至线形，先端钝或锐尖，基部楔形，近于无柄。总状花序顶生，花密集，常转向一侧；花冠白色，管状钟形，5 ~ 7深裂。蒴果球形。

花期：5 ~ 8月。

生境：生于海拔2000米以下的草甸、山坡路旁灌丛间。

分布：东北、华北、西北、华东、华中、西南。

观赏及其他用途：可成片栽培于林缘观赏或配置于花境中，极富野趣。

七瓣莲

Trientalis europaea

报春花科，七瓣莲属。多年生小草本。茎直立，高5～25厘米。叶5～10枚聚生茎端呈轮生状，叶片披针形至倒卵状椭圆形，先端锐尖或稍钝，具短柄或近于无柄，边缘全缘或具不明显的微细圆齿。花1～3朵，单生于茎端叶腋；花冠白色，7裂达基部，裂片卵状披针形。

花期：5～6月。

生境：生于针叶林或混交林下肥沃腐殖土中。

分布：东北、内蒙古和河北省北部。广布于欧亚大陆和北美洲的亚寒带地区。

观赏及其他用途：花洁白美丽，北方地区可栽培于林下观赏。

琉璃繁缕

Anagallis arvensis

报春花科，琉璃繁缕属。一年生或二年生草本，高10～30厘米。茎匍匐或上升。叶交互对生或有时3枚轮生，卵圆形至狭卵形，全缘，先端钝或稍锐尖，基部近圆形，无柄。花单出腋生；花梗纤细；冠辐状，长4～6毫米，浅蓝色或淡红色，分裂近达基部，裂片倒卵形。

花期：3～5月。

生境：生于海边沙地或沿海的田野及荒地中。

分布：浙江、福建、广东、台湾。广布于全世界温带和热带地区。

观赏及其他用途：植株小巧，花色艳丽可爱，可播种作野生花境观赏。

秦巴点地梅

Androsace laxa

报春花科，点地梅属。多年生草本，植株由着生于根出条上的莲座状叶丛形成垫状疏丛。叶2型，外层叶匙形或倒披针形，内层叶椭圆形至近圆形。伞形花序3 ~ 6花；花梗长2.5 ~ 5毫米，花冠粉红色，直径5 ~ 6毫米，裂片倒卵圆形，先端近圆形。

花期：6 ~ 7月。

生境：生于海拔2700 ~ 3600米的山坡林缘和岩石上。

分布：四川、湖北、陕西。

观赏及其他用途：花小巧美丽，极美的高山垫状草本花卉。

紫罗兰报春

Primula purdomii

报春花科，报春花属。多年生草本。叶片披针形、矩圆状披针形或倒披针形，先端锐尖或钝，基部渐狭窄，边缘近全缘或具不明显的小钝齿。花莛高8 ~ 20厘米，近顶端被白粉；伞形花序1轮，具8 ~ 12花；花冠蓝紫色至近白色，裂片矩圆形或狭矩圆形。

花期：6 ~ 7月。

生境：生长于海拔3300 ~ 4100米湿草地、灌木林下和潮湿石缝中。

分布：青海、甘肃、四川和陕西省。

观赏及其他用途：株形紧凑，花色艳丽，可栽培观赏。

安徽羽叶报春

Primula merrilliana

报春花科，报春花属。多年生草本。叶10 ~ 20枚簇生，连柄长2 ~ 11厘米，宽7 ~ 20毫米，羽状全裂，羽片通常7 ~ 9对。花莛直立，稍纤细，长3 ~ 7厘米，稍高出叶丛；伞形花序1 ~ 2轮，每轮2 ~ 3花；花冠白色或微带蓝紫色，冠筒长5 ~ 6.5毫米，喉部具环状附属物，裂片倒卵状椭圆形或倒卵状矩圆形，全缘。

花期：4 ~ 5月。

生境：生长于海拔300 ~ 1100米的山谷、沟边草丛中。

分布：安徽、浙江。

观赏及其他用途：花和植株小巧可爱，可种植于岩石园阴湿处观赏。

苣叶报春

Primula sonchifolia

报春花科，报春花属。多年生草本。叶矩圆形至倒卵状矩圆形，先端圆形或稍锐尖，基部渐狭窄，边缘不规则浅裂，裂片具不整齐的小牙齿。花莛初期甚短，盛花期与叶丛近等长，果期更长，近顶端被黄粉；伞形花序3至多花；花冠蓝色至红色，稀白色。

花期：3 ~ 5月。

生境：生长于海拔3000 ~ 4600米高山草地和林缘。

分布：西南大部省区。

观赏及其他用途：花色艳丽，株形紧凑，可栽培于庭院中观赏。

鹅黄灯台报春

Primula cockburniana

报春花科，报春花属。二年生草本。叶矩圆形至矩圆状倒卵形，先端圆形，基部近圆形或阔楔形，边缘呈不明显的浅波状，具细密的小牙齿。花莛通常1枚，自叶丛中抽出，高15 ~ 30厘米；具伞形花序1 ~ 4（5）轮，每轮3 ~ 8花；花深橙黄色至橙红色，喉部具环状附属物，冠檐直径约1.5厘米，裂片长方倒卵形。

花期：6 ~ 7月。

生境：生长于海拔2900 ~ 4200米的高山潮湿草地和林缘。

分布：四川西部。

观赏及其他用途：花色艳丽，极好的观赏花卉。

钟花报春

Primula sikkimensis

报春花科，报春花属。多年生草本。叶丛高7 ~ 30厘米；叶片椭圆形至矩圆形或倒披针形，先端圆形或有时稍锐尖，基部通常渐狭窄，边缘具锐尖或稍钝的锯齿或牙齿。花莛稍粗壮，高15 ~ 90厘米，顶端被黄粉；伞形花序通常1轮，2至多花；花冠黄色，稀为乳白色，裂片倒卵形或倒卵状矩圆形，全缘或先端具凹缺。

花期：6 ~ 7月。

生境：生长于海拔3200 ~ 4400米的林缘湿地、沼泽草甸和水沟边。

分布：四川、云南和西藏。

观赏及其他用途：花色艳丽，常成片生长，西南高海拔常见野花。

紫花雪山报春

Primula chionantha

报春花科，报春花属。多年生草本。叶形变异较大，矩圆状卵形至倒披针形，长5 ~ 20厘米，宽1 ~ 5厘米，先端锐尖或钝，基部渐狭窄，边缘具细小牙齿或近全缘。花莛粗壮，高20 ~ 50厘米，伞形花序1 ~ 4轮，每轮3至多花；花冠紫蓝色或淡蓝色，稀白色，裂片阔椭圆形至近卵形，全缘。

花期：5 ~ 7月。

生境：生长于海拔3000 ~ 4400米的高山草地、草甸、流石滩或杜鹃丛中。

分布：四川，云南和西藏。

观赏及其他用途：花色艳丽动人，成片生长观赏效果极佳。

偏花报春

Primula secundliflora

报春花科，报春花属。多年生草本。叶通常多枚丛生；叶片矩圆形、狭椭圆形或倒披针形，连柄长5 ~ 15厘米，宽1 ~ 3厘米，先端钝圆或稍锐尖，基部渐狭窄，边缘具三角形小牙齿。花莛高10 ~ 60厘米，伞形花序5 ~ 10花；花梗长1 ~ 5厘米，花冠红紫色至深玫瑰红色，长1.5 ~ 2.5厘米，喉部无环状附属物；裂片倒卵状矩圆形。

花期：6 ~ 7月。

生境：生长于海拔3200 ~ 4800米的水沟边、河滩地、高山沼泽和湿草地。

分布：青海、四川、云南和西藏。

观赏及其他用途：西南高山常见美丽野花，可栽培驯化观赏。

海桐

Pittosporum tobira

海桐花科，海桐花属。常绿灌木或小乔木，高达6米。叶聚生于枝顶，革质，倒卵形，先端圆，全缘；上面深绿色。伞形花序或伞房状伞形花序顶生或近顶生，密被黄褐色柔毛，花梗长1～2厘米；花白色，有芳香，后变黄色；萼片卵形；花瓣倒披针形，离生。蒴果圆球形。

花期：5～6月。

生境：生于林下溪沟边或海边岩石缝中。

分布：长江以南滨海各省。全国各地普遍栽培。

观赏及其他用途：常用作园林绿化观赏树种，株形美观，对二氧化硫等有毒气体有较强抗性；叶、根可药用。

小丛红景天

Rhodiola dumulosa

景天科，红景天属。多年生矮小草本。叶互生，线形至宽线形，长7 ~ 10毫米，宽1 ~ 2毫米，先端稍急尖，基部无柄，全缘。花茎聚生主轴顶端，长5 ~ 28厘米，直立或弯曲；花序聚伞状，有4 ~ 7花；花瓣5，白或红色，披针状长圆形，直立。

花期：6 ~ 7月。

生境：生于海拔1600 ~ 3900米的山坡岩石上。

分布：东北、华北、西北及西南部分省区。

观赏及其他用途：根茎可药用。

紫花八宝

Hylotelephium mingjinianum

景天科，八宝属。多年生草本，无毛。茎直立，高20～40厘米，不分枝。叶互生，上部的线形，下部的椭圆状倒卵形，先端急尖，基部渐狭，边缘上部波状钝齿状，下部全缘。花序顶生，伞房状，密集，长7厘米，宽10厘米；花瓣5，紫色，倒卵状长圆形。

花期：9～10月。

生境：生于海拔600～900米的山间溪边阴湿处或岩石上。

分布：华中及华东部分省区。

观赏及其他用途：可栽培于岩石园中供观赏；全株可药用。

东南景天

Sedum alfredii

景天科，景天属。多年生草本。茎斜上，单生或上部有分枝，高10 ~ 20厘米。叶互生，线状楔形、匙形至匙状倒卵形，长1.2 ~ 3厘米，宽2 ~ 6毫米，先端钝，基部狭楔形，有距，全缘。聚伞花序宽5 ~ 8厘米，有多花；花无梗，直径1厘米；萼片5，线状匙形，基部有距；花瓣5，黄色，披针形至披针状长圆形。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于海拔1400米以下（在四川可到2000 ~ 3000米）山坡林缘或岩石上。

分布：华东、华中、华南、西南。

观赏及其他用途：耐高温及干旱，花色鲜艳美丽，极好的岩石园观赏植物。

山飘风

Sedum majus

景天科，景天属。小草本，高10厘米，基部分枝或不分枝。4叶轮生，叶圆形至卵状圆形，先端圆或钝，基部急狭，全缘。伞房状花序，总梗长1.5 ~ 3厘米；萼片5，近正三角形，长0.5毫米，先端钝；花瓣5，白色，长圆状披针形。

花期：7 ~ 10月。

生境：生于海拔1000 ~ 4000米的山坡林下阴湿岩石上。

分布：西藏、云南、四川、湖北、陕西。

观赏及其他用途：可用于岩石园栽培；全株可入药。

宁波溲疏

Deutzia ningpoensis

虎耳草科，溲疏属。灌木，高1 ~ 2.5米。叶厚纸质，卵状长圆形或卵状披针形，长3 ~ 9厘米，宽1.5 ~ 3厘米，先端渐尖或急尖，基部圆形或阔楔形，边缘具疏离锯齿或近全缘。聚伞状圆锥花序，长5 ~ 12厘米，直径2.5 ~ 6厘米，多花；花瓣白色，长圆形。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔500 ~ 800米山谷或山坡林中。

分布：陕西、安徽、湖北、江西、福建、浙江。

观赏及其他用途：花色洁白美丽，可栽培于水边或林缘观赏。

浙江山梅花

Philadelphus zhejiangensis

虎耳草科，山梅花属。灌木，高1 ~ 3米；叶椭圆形或椭圆状披针形，长5 ~ 9厘米，宽2 ~ 4.5厘米，先端渐尖，基部楔形或阔楔形，边缘具锯齿，上面疏被糙伏毛。总状花序有花5 ~ 13朵；花瓣4，白色，椭圆形或阔椭圆形，长1.2 ~ 1.8厘米，宽1 ~ 1.2厘米，顶端圆，有时凹入或齿缺，基部急收狭。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔700 ~ 1700米山谷疏林下或溪沟边。

分布：华东部分省区。

观赏及其他用途：花色洁白美丽，可作观花灌木栽培观赏。

草绣球

Cardiandra moellendorffii

虎耳草科，草绣球属。亚灌木，高0.4 ~ 1米。叶互生，纸质，椭圆形或倒长卵形，长6 ~ 13厘米，宽3 ~ 6厘米，先端渐尖或短渐尖，边缘有粗长牙齿状锯齿。伞房状聚伞花序顶生，不育花萼片2 ~ 3，较小，近等大，阔卵形至近圆形，白色或粉红色；孕性花萼筒杯状，花瓣阔椭圆形至近圆形，长2.5 ~ 3毫米，淡红色或白色。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔700 ~ 1500米的山谷密林或山坡疏林下。

分布：华东大部省区。

观赏及其他用途：可作湿地观赏植物；块状根茎可入药。

蜡莲绣球

Hydrangea strigosa

虎耳草科，绣球属。落叶灌木，高1 ~ 3米。枝老后常呈薄片状剥落。叶纸质，长圆形至倒卵状披针形，先端渐尖，基部楔形、钝或圆形，边缘具硬尖头小齿或小锯齿。伞房状聚伞花序可达30厘米；不育花萼片4 ~ 5；孕性花淡紫红色。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔500 ~ 1800米的山谷林中或山坡路旁疏林或灌丛中。

分布：华中、西南及陕西省。

观赏及其他用途：花序硕大，色彩美丽，可栽培于庭园供观赏。

七叶鬼灯檠

Rodgersia aesculifolia

虎耳草科，鬼灯檠属。多年生草本，高0.8 ~ 1.2米。掌状复叶具长柄，柄长15 ~ 40厘米；叶片5 ~ 7，草质，倒卵形至倒披针形；先端短渐尖，基部楔形，边缘具重锯齿。多歧聚伞花序圆锥状，长约26厘米。蒴果卵形，具喙。

花期：5 ~ 10月。

生境：生于海拔1100 ~ 3400米的林下、灌丛、草甸和石隙。

分布：陕西、宁夏、甘肃、河南、湖北、四川和云南。

观赏及其他用途：叶硕大美丽，可栽培于林下供观赏；根可制作食物，亦可入药。

岩白菜

Bergenia purpurascens

虎耳草科，岩白菜属。多年生草本，高13 ~ 52厘米。叶片革质，倒卵形、狭倒卵形至近椭圆形，长5.5 ~ 16厘米，宽3 ~ 9厘米，先端钝圆，边缘具波状齿至近全缘，基部楔形。聚伞花序圆锥状，长3 ~ 23厘米；萼片革质，近狭卵形，先端钝；花瓣紫红色，阔卵形，先端钝或微凹。

花期：5 ~ 10月。

生境：生于海拔2700 ~ 4800米的林下、灌丛、高山草甸和高山碎石隙。

分布：产四川、云南及西藏。

观赏及其他用途：可盆栽观赏，也可栽培于花坛观赏；根状茎可入药。

虎耳草

Saxifraga stolonifera

虎耳草科，虎耳草属。多年生草本，高8 ~ 45厘米。鞭匐枝细长，密被卷曲长腺毛，具鳞片状叶。基生叶具长柄，叶片近心形、肾形至扁圆形，先端钝或急尖，基部近截形、圆形至心形，浅裂，裂片边缘具不规则齿牙，背面通常红紫色。聚伞花序圆锥状，花两侧对称；萼片在花期开展时反曲，卵形；花瓣白色，中上部具紫红色斑点，基部具黄色斑点，5枚，其中3枚较短，卵形。

花期：4 ~ 9月。

生境：生于海拔400 ~ 4500米的林下、灌丛、草甸和荫湿岩隙。

分布：华北、西北、华东、华南、西南等地。

观赏及其他用途：适应性较强，极好的地被植物和岩生植物；嫩茎叶可食用，全草可入药。

黄水枝

Tiarella polyphylla

虎耳草科，黄水枝属。多年生草本，高20 ~ 45厘米。茎不分枝，密被腺毛。基生叶具长柄，叶片心形，先端急尖，基部心形，掌状3 ~ 5浅裂，边缘具不规则浅齿，两面密被腺毛。总状花序长8 ~ 25厘米；萼片在花期直立，卵形，花瓣狭披针形，常缺失。

花期：4 ~ 11月。

生境：生于海拔980 ~ 3800米的林下、灌丛和阴湿地。

分布：产华东、华南、华中、西南、西北等地。

观赏及其他用途：叶片形色俱佳，可盆栽或作地被观赏；全草可入药。

日本金腰

Chrysosplenium japonicum

虎耳草科，金腰属。多年生草本，高8.5 ~ 15.5厘米，丛生；茎基具珠芽。茎疏生柔毛。基生叶肾形，边缘具浅齿，基部心形或肾形；茎生叶与基生叶同形，在茎上互生。聚伞花序长1.5 ~ 4厘米；花序分枝疏生柔毛；苞叶阔卵形至近扇形，几无花梗；花密集，绿色，直径约3毫米。

花期：3 ~ 6月。

生境：生于海拔500米左右的林下或山谷湿地。

分布：产吉林、辽宁、安徽、浙江和江西。

观赏及其他用途：可作林下地被观赏。

梅花草

Parnassia palustris

虎耳草科，梅花草属。多年生草本，高12 ~ 20厘米。基生叶3至多数，具柄，卵形至长卵形，先端圆钝或渐尖，基部近心形，边全缘，微向外反卷。茎生叶与基生叶同形，基部常有铁锈色的附属物。花单生茎顶；萼片椭圆形或长圆形，先端钝，全缘；花瓣白色，宽卵形或倒卵形。

花期：7 ~ 9月。

生境：生于海拔1200 ~ 2000米的潮湿山坡草地中、沟边或河谷地阴湿处。

分布：产东北、华北、西北等地。

观赏及其他用途：可种植于阴湿的岩石园供观赏，也可制作干花装饰品。

菱叶绣线菊

Spiraea × vanhouttei

蔷薇科，绣线菊属。落叶灌木，小枝红褐色。叶片菱状卵形至菱状倒卵形，通常3 ~ 5裂，边缘有缺刻状重锯齿，两面无毛。伞形花序具总梗，基部具数枚叶片，各部均无毛；花白色，花瓣近圆形。

花期：5 ~ 6月。

生境：常栽培供观赏。

分布：华北、华东、华南及西南部分省区有栽培供观赏。

观赏及其他用途：叶形秀丽，花洁白美丽，常栽培于庭园或公园中观赏。

白鹃梅

Exochorda racemosa

蔷薇科，白鹃梅属。灌木，高3 ~ 5米。叶片椭圆形至长圆倒卵形，全缘，稀中部以上有钝锯齿。总状花序，有花6 ~ 10朵，无毛；苞片小，宽披针形；萼筒浅钟状；萼片宽三角形；花瓣倒卵形，先端钝，基部有短爪，白色；雄蕊15 ~ 20，3 ~ 4枚一束着生在花盘边缘，与花瓣对生；心皮5，花柱分离。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于海拔250 ~ 500米的山坡。

分布：产河南、江西、江苏、浙江。

观赏及其他用途：花洁白美丽，可栽培作园林观赏树种。

中华石楠

Photinia beauverdiana

蔷薇科，石楠属。落叶灌木或小乔木，高3 ~ 10米；小枝无毛，紫褐色，有散生灰色皮孔。叶片薄纸质，长圆形至卵状披针形，边缘有疏生具腺锯齿。花多数，成复伞房花序；花直径5 ~ 7毫米；萼筒杯状；花瓣白色，卵形或倒卵形，先端圆钝。

花期：5月。

生境：生于海拔500 ~ 1700米的溪沟边、山坡或山谷林下。

分布：产长江以南各省区。

观赏及其他用途：花期满树洁白，果时红艳动人，是极好的观花观果植物。

毛山荆子

Malus mandshurica

蔷薇科，苹果属。乔木，高达15米；小枝细弱，圆柱形。叶片卵形、椭圆形至倒卵形，边缘有细锯齿，基部锯齿浅钝近于全缘。伞形花序具花3～6朵，无总梗，集生在小枝顶端；花直径3～3.5厘米，萼片披针形，先端渐尖，全缘，花瓣长倒卵形，基部有短爪，白色。果实椭圆形或倒卵形，红色。

花期：5～6月。

生境：生山海拔100～2100米的山坡杂木林中，山顶及山沟也有分布。

分布：产东北、华北、西北、华东。

观赏及其他用途：花洁白或蕾时粉红色，花量大，可栽培作观花乔木，也可作苹果或花红等果树砧木。

野草莓

Fragaria vesca

蔷薇科，草莓属。多年生草本。高5 ~ 30厘米。3小叶稀羽状5小叶，小叶无柄或顶端小叶具短柄；小叶片倒卵圆形至宽卵圆形，顶端圆钝，边缘具缺刻状锯齿，锯齿圆钝或急尖。花序聚伞状，有花2 ~ 4朵；萼片卵状披针形，顶端尾尖，副萼片窄披针形或钻形，花瓣白色，倒卵形，基部具短爪。聚合果卵球形，红色。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于山坡、草地、林下。

分布：产吉林、西北及西南部分省区。

观赏及其他用途：花小巧可爱，果鲜亮可食。

银露梅

Potentilla glabra

蔷薇科，委陵菜属。灌木，高0.3 ~ 2米，稀达3米，树皮纵向剥落。小枝灰褐色或紫褐色，被稀疏柔毛。叶为羽状复叶，有小叶2对，稀3小叶；小叶片椭圆形至卵状椭圆形，缘平坦或微向下反卷，全缘。顶生单花或数朵，花梗细长，被疏柔毛；花瓣白色，倒卵形，顶端圆钝；花柱近基生，棒状。

花期：6 ~ 11月。

生境：生于海拔1400 ~ 4200米的山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中。

分布：产华北、西北、华中及西南部分省区。

观赏及其他用途：花色纯白，适宜作庭园观赏灌木。



棣棠花

Kerria japonica

蔷薇科，棣棠花属。落叶灌木，高1 ~ 2米，稀达3米；小枝绿色，圆柱形，嫩枝有棱角。叶互生，三角状卵形或卵圆形，边缘有尖锐重锯齿。单花，着生在当年生侧枝顶端；花直径2.5 ~ 6厘米；萼片卵状椭圆形，顶端急尖，有小尖头，全缘；花瓣黄色，宽椭圆形，顶端下凹。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔200 ~ 3000米的山坡灌丛中。

分布：产西北、华北、华东、华中、西南。

观赏及其他用途：花美丽，可用于庭院、公园栽培观赏，有多个栽培品种。

峨眉蔷薇

Rosa omeiensis

蔷薇科，蔷薇属。直立灌木，高3 ~ 4米；小枝细弱，无刺或有扁而基部膨大皮刺，幼嫩时常密被针刺或无针刺。小叶9 ~ 13，小叶片长圆形或椭圆状长圆形，先端急尖或圆钝，基部圆钝或宽楔形，边缘有锐锯齿。花单生于叶腋，无苞片；萼片4，披针形，全缘；花瓣4，白色，倒三角状卵形，先端微凹，基部宽楔形。果倒卵球形或梨形。

花期：5 ~ 6月。

生境：多生于海拔750 ~ 4000米的山坡、山脚下或灌丛中。

分布：产西北、华中及西南部分省区。

观赏及其他用途：果实味甜可食，花大而纯洁美丽，可作为园林观赏灌木。

迎春樱桃

Cerasus discoidea

蔷薇科，樱属。小乔木，高2 ~ 6米，树皮灰白色。叶片倒卵状长圆形或长椭圆形，有缺刻状急尖锯齿，齿端有小盘状腺体，先端尾尖。花先叶开放，基部常有褐色革质鳞片；总苞片褐色，倒卵状椭圆形，顶端有齿裂；萼片长圆形；花瓣粉红色，长椭圆形，先端二裂。核果红色。

花期：3月。

生境：生于海拔200 ~ 1100米的山谷林中或溪边灌丛中。

分布：产安徽、浙江、江西。

观赏及其他用途：早春开粉红色小花，可作为庭院树种栽培。



豆科

云实

Caesalpinia decapetala

豆科，云实属。藤本；树皮暗红色；枝、叶轴和花序均被柔毛和钩刺。二回羽状复叶长20 ~ 30厘米；羽片3 ~ 10对，对生，基部有刺1对；小叶8 ~ 12对，膜质，长圆形。总状花序顶生，长15 ~ 30厘米；总花梗多刺；花瓣黄色，膜质，圆形或倒卵形，长10 ~ 12毫米，盛开时反卷；荚果长圆状舌形。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于山坡灌丛中及平原、丘陵、河旁等处。

分布：产华南、西南、华中、华东、华北、西北等地。

观赏及其他用途：花鲜艳亮丽，可栽培作观花刺篱；根、茎及果药用，种子含油，可制肥皂及润滑油。

龙须藤

Bauhinia championii

豆科，羊蹄甲属。藤本，有卷须；嫩枝和花序薄被紧贴的小柔毛。叶纸质，卵形或心形，先端锐渐尖、圆钝、微凹或2裂，裂片长度不一。总状花序狭长，腋生，萼片披针形，长约3毫米；花瓣白色，具瓣柄，瓣片匙形。荚果倒卵状长圆形或带状，扁平。

花期：6 ~ 10月。

生境：生于低海拔至中海拔的丘陵灌丛或山地疏林和密林中。

分布：产华东、华南、华中及贵州省。

观赏及其他用途：叶形奇特，花洁白美丽，可栽培于庭院中供观赏。

云南高山豆

Tibetia yunnanensis

豆科，高山豆属。多年生草本，根通常纺锤状，发达。小叶3 ~ 7，圆倒卵形至倒心形，顶端截形至微凹缺，被贴伏疏柔毛。伞形花序具1 ~ 2花；花冠紫色，旗瓣倒心形，顶端微凹，翼瓣近楔形，龙骨瓣倒卵形。

花期：6 ~ 7月。

生境：海拔2500 ~ 4000米的山区开阔地或针叶林下。

分布：四川、云南。

观赏及其他用途：高山上常见分布的乖巧小花，色彩艳丽，适应性极强。

紫藤

Wisteria sinensis

豆科，紫藤属。落叶藤本。奇数羽状复叶；小叶纸质，卵状椭圆形至卵状披针形。总状花序发自去年短枝的腋芽或顶芽，花长2 ~ 2.5厘米，芳香；花梗细，长2 ~ 3厘米；花萼杯状，花冠紫色，旗瓣圆形，先端略凹陷，花开后反折。荚果倒披针形。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于向阳山坡、沟谷、旷地、灌草丛中或疏林下。

分布：产河北以南黄河长江流域及陕西、河南、广西、贵州、云南。

观赏及其他用途：花开放时极为繁茂壮观，常种植于庭院或公园的藤架上供观赏；花可食用。

庭藤

Indigofera decora

豆科，木蓝属。灌木，高0.4 ~ 2米。茎圆柱形或有棱。羽状复叶长8 ~ 25厘米；小叶3 ~ 7对，对生或近对生，叶卵状披针形至长圆状披针形。总状花序腋生，长约13 ~ 20厘米，直立；花冠淡紫色或粉红色，稀白色，旗瓣椭圆形，被柔毛。荚果圆柱形。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔200 ~ 1800米的溪边、沟谷旁及杂木林和灌丛中。

分布：产安徽、浙江、福建、广东。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，叶形秀丽，可栽培于庭园中观赏或作边坡绿化。

多花胡枝子

Lespedeza floribunda

豆科，胡枝子属。小灌木，高30 ~ 60厘米。枝具棱，被灰白色茸毛。3小叶；小叶具柄，倒卵形，宽倒卵形或长圆形；侧生小叶较小。总状花序腋生；总花梗细长，显著超出叶；花冠紫色、紫红色或蓝紫色，旗瓣椭圆形。

花期：6 ~ 9月。

生境：生于海拔1300米以下的石质山坡。

分布：产东北南部、华北、西北、华东、华中、华南等地。

观赏及其他用途：可成片栽培于林缘观赏或作边坡绿化。

百脉根

Lotus corniculatus

豆科，百脉根属。多年生草本，高15 ~ 50厘米。茎丛生，平卧或上升，近四棱形。羽状复叶，小叶5枚；疏被柔毛，顶端3小叶，基部2小叶呈托叶状，斜卵形至倒披针状卵形。伞形花序；总花梗长3 ~ 10厘米；花3 ~ 7朵集生于总花梗顶端；花冠黄色或金黄色，旗瓣扁圆形，瓣片和瓣柄几等长。

花期：5 ~ 9月。

生境：生于湿润而呈弱碱性的山坡、草地、田野或河滩地。

分布：产西北、西南和长江中上游各省区。

观赏及其他用途：花可爱靓丽，可成片栽培观赏；良好的牧草或饲料；又是优良的蜜源植物之一。

香花崖豆藤

Millettia dielsiana

豆科，崖豆藤属。攀援灌木，长2 ~ 5米。枝无毛或被微毛。羽状复叶；叶柄长5 ~ 12厘米，小叶2对，纸质，披针形，长圆形至狭长圆形。圆锥花序顶生，宽大，长达40厘米；花单生于花序轴上，松散排列；花冠紫红色，旗瓣阔卵形至倒阔卵形。

花期：5 ~ 9月。

生境：生于山坡杂木林与灌丛中或谷地、溪沟和路旁。

分布：产秦岭以南各省区。

观赏及其他用途：花色艳丽，枝叶浓绿，可种植于廊架或边坡旁供观赏。

广布野豌豆

Vicia cracca

豆科，野豌豆属。多年生草本，高40 ~ 150厘米。茎攀援或蔓生，有棱，被柔毛。偶数羽状复叶，叶轴顶端卷须有分支；小叶5 ~ 12对互生，线形、长圆形或披针状线形。总状花序与叶轴近等长，花密集一面生于总花序轴上部；花萼钟状，萼齿5，近三角状披针形；花冠紫色、蓝紫色或紫红色。

花期：5 ~ 9月。

生境：广布于草甸、林缘、山坡、河滩草地及灌丛。

分布：全国都有分布。

观赏及其他用途：本种为水土保持绿肥作物；嫩时为牛羊等牲畜喜食饲料，为早春蜜源植物之一。

大托叶猪屎豆

Crotalaria spectabilis

豆科，猪屎豆属。一年生直立高大草本，高60 ~ 150厘米。托叶明显，卵状三角形；单叶，叶片质薄，倒披针形或长椭圆形。总状花序顶生或腋生，有花20 ~ 30朵；花冠淡黄色或有时为紫红色，旗瓣圆形或长圆形，龙骨瓣极弯曲，中部以上变狭形成长喙，下部边缘具白色柔毛，伸出花萼之外。

花期：8 ~ 12月。

生境：生于海拔1500米以下的田园路旁及荒山草地。

分布：产华中、华东、华南。

观赏及其他用途：花序硕大，色彩艳丽，可栽培于庭院中观赏。

黄花木

Piptanthus concolor

豆科，黄花木属。灌木，高1 ~ 4米，茎上散布不明显皮孔；枝圆柱形，具沟棱。小叶椭圆形、长圆状披针形至倒披针形，两侧不等大，纸质，先端渐尖或锐尖，基部楔形。总状花序顶生，疏被柔毛，具花3 ~ 7轮；花冠黄色，旗瓣中央具暗棕色斑纹，瓣片圆形，基部截形，翼瓣稍短，龙骨瓣与旗瓣等长或稍长。

花期：4 ~ 7月。

生境：生于海拔1600 ~ 4000米的山坡林缘和灌丛中。

分布：产陕西、甘肃、四川、云南、西藏。

观赏及其他用途：花色靓丽，可栽培于庭院或公园中供观赏。

野大豆

Glycine soja

豆科，大豆属。一年生缠绕草本；全体疏被褐色长硬毛。叶具3小叶，托叶卵状披针形，急尖，被黄色柔毛；顶生小叶卵圆形或卵状披针形；侧生小叶斜卵状披针形。总状花序通常短，花小，长约5毫米；花梗密生黄色长硬毛；花冠淡红紫色或白色，旗瓣近圆形，先端微凹，基部具短瓣柄，翼瓣斜倒卵形，有明显的耳。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔2600米以下的潮湿田边、园边、沟旁、河岸、湖边、沼泽、草甸、沿海和岛屿向阳的矮灌木丛或芦苇丛中。

分布：除新疆、青海和海南外，遍布全国。

观赏及其他用途：国家保护植物，是大豆的基因资源库。

木半夏

Elaeagnus multiflora

胡颓子科，胡颓子属。落叶直立灌木，高2 ~ 3米，通常无刺，稀老枝上具刺。叶膜质或纸质，椭圆形至倒卵状阔椭圆形，顶端钝尖或骤渐尖，基部钝形，全缘。花白色，被银白色和散生少数褐色鳞片，常单生新枝基部叶腋；萼筒圆筒形，裂片宽卵形。果实椭圆形。

花期：5月。

生境：生于海拔200 ~ 1300米的疏灌木丛及荒山路旁。

分布：华北、华东、华中、西南等地。

观赏及其他用途：株形紧凑，可栽培作为庭院花灌木；叶、果药用，果实还可食用。

圆叶节节菜

Rotala rotundifolia

千屈菜科，节节菜属。一年生草本，各部无毛；根茎细长，匍匐地面；茎单一或稍分枝，直立，丛生，高5～30厘米，带紫红色。叶对生，无柄或具短柄，近圆形、阔倒卵形或阔椭圆形。花单生于苞片内，组成顶生稠密的穗状花序，花几无梗；花瓣4，倒卵形，淡紫红色。

花期：12月至次年6月。

生境：生于水田或潮湿的地方。

分布：长江以南各省区。

观赏及其他用途：可种植于湿地观赏；是我国南部水稻田的主要杂草之一，常用作猪饲料。

橙花瑞香

Daphne aurantiaca

瑞香科，瑞香属。常绿小灌木，高0.6 ~ 1.2米；枝短而密集，无毛，小枝红褐色或褐色。叶近对生，近革质，椭圆形或倒卵形至长倒卵形，基部楔形或钝形，边缘反卷。花橙黄色，芳香，常2 ~ 4朵成簇，顶生或腋生；花梗短，长约1毫米；花萼筒漏斗状圆筒形，无花瓣。果实球形。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔2600 ~ 3500米的石灰岩阴坡杂木林中或灌丛中。

分布：四川、云南。

观赏及其他用途：可栽培于庭园中观赏；茎皮纤维可造纸或人造棉。

毛瑞香

Daphne kiusiana var. *atrocaulis*

瑞香科，瑞香属。常绿灌木，高0.5 ~ 1.2米；枝深紫色或紫红色。叶互生，有时簇生于枝顶，叶片革质，椭圆形或披针形，两端渐尖，基部下延于叶柄，边缘全缘，微反卷。花白色，有时淡黄白色，9 ~ 12朵簇生于枝顶，呈头状花序；花萼筒圆筒状，无花瓣。果实卵状椭圆形，红色。

花期：11月至次年2月。

生境：生于海拔300 ~ 1400米的林缘或疏林中。

分布：华东、华中、华南、西南。

观赏及其他用途：花洁白素雅，可栽培于庭院中供观赏；茎皮纤维可造纸或人造棉。

芫花

Daphne genkwa

瑞香科，瑞香属。落叶灌木，高0.3 ~ 1.5米，多分枝；树皮褐色，无毛。叶对生，稀互生，纸质，卵形至椭圆状长圆形，先端急尖或短渐尖，基部宽楔形或钝圆形，边缘全缘。先花后叶，花紫色或淡紫蓝色，无香味，常3 ~ 6朵簇生于叶腋或侧生；花萼筒细瘦，筒状。果实肉质，白色，椭圆形。

花期：3 ~ 5月。

生境：生于海拔300 ~ 1000米的向阳山坡、灌丛、草丛、路旁、疏林下。

分布：产华北、华东、华中、西南等地。

观赏及其他用途：花繁色艳，满树盛放时十分壮观，极具推广价值的观花灌木。

了哥王

Wikstroemia indica

瑞香科，荛花属。灌木，高0.5 ~ 2米；小枝红褐色，无毛。叶对生，纸质至近革质，倒卵形至披针形，先端钝或急尖，基部楔形。花黄绿色，数朵组成顶生短总状花序，花萼长7 ~ 12毫米，近无毛，裂片4；宽卵形至长圆形。果椭圆形，熟时红色至暗紫色。

花期：5 ~ 10月。

生境：生于海拔1500米以下地区的开旷林下或石山上。

分布：产华东、华南、西南。

观赏及其他用途：全株有毒，可药用；茎皮纤维可作造纸原料。

柳叶菜

Epilobium hirsutum

柳叶菜科，柳叶菜属。多年生草本，高0.5 ~ 1.2米。茎密被开展的白色长柔毛及短腺毛。下部和中部叶对生，上部互生，长圆形至卵状披针形，边缘具细锯齿，两面具长柔毛。花单生于叶腋，淡红色或紫红色，萼筒圆柱形，裂片4，外面被毛，花瓣4，宽倒卵形，顶端凹缺。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于海拔150 ~ 2800米河谷、溪流河床沙地或石砾地或沟边、湖边向阳湿处，也生于灌丛、荒坡、路旁，常成片生长。

分布：广布全国各省区。

观赏及其他用途：可栽培于湿地旁观赏；嫩苗嫩叶可作色拉凉菜；根或全草入药。

地菍

Melastoma dodecandrum

野牡丹科，野牡丹属。小灌木，长10 ~ 30厘米；茎匍匐上升分枝多，幼时被糙伏毛，后无毛。叶片坚纸质，卵形或椭圆形，顶端急尖，基部广楔形，全缘或具密浅细锯齿。聚伞花序，顶生，有花1 ~ 3朵，基部有叶状总苞2，通常较叶小。花瓣淡紫红色至紫红色，菱状倒卵形，上部略偏斜。果坛状球形。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔1250米以下的山坡矮草丛中，为酸性土壤常见植物。

分布：产华东、华南及湖南、贵州。

观赏及其他用途：花可爱美丽，可栽培作地被观赏；果可食，亦可酿酒；全株供药用。

过路惊

Bredia quadrangularis

野牡丹科，野海棠属。常绿小灌木，高30 ~ 120厘米；小枝四棱形，棱上多少具狭翅，无毛。叶片坚纸质，卵形至椭圆形，顶端短渐尖，钝圆，基部楔形，边缘具疏浅锯齿或近全缘。聚伞花序生于枝条顶端；花萼短钟形，具四棱，花瓣玫瑰色至紫色，卵形，顶端急尖，略偏斜。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于海拔300 ~ 1400米的山坡、山谷林下阴湿处或路旁。

分布：产华东、华中及华南部分省区。

观赏及其他用途：可成片栽培作地被观赏。

星毛金锦香

Osbeckia stellata

野牡丹科，金锦香属。灌木，高0.3 ~ 1.2米；茎四棱形或稀六棱形，被平贴或上升的糙伏毛。叶对生或有时3枚轮生，叶坚纸质，卵形至卵状披针形，顶端渐尖，基部钝或圆形，全缘，具缘毛。疏的聚伞花序组成圆锥花序，顶生；花萼裂片4，花瓣深红色至紫色，卵形。蒴果长卵形。

花期：7 ~ 9月。

生境：生于海拔250 ~ 800米的山坡、山谷、水边、路旁、疏林中或灌木丛中。

分布：产长江流域以南各省区。

观赏及其他用途：花大色艳，蒴果形态可掬，可栽培观赏。

四照花

Cornus kousa subsp. *chinensis*

山茱萸科，山茱萸属。落叶小乔木，高达8米。叶对生，卵状椭圆形，先端渐尖，基部圆形或宽楔形。头状花序球形，具花20 ~ 30朵，总状苞片卵形或卵状披针形，白色，花萼4裂片，花瓣4，黄色，花盘垫状。果序球形，熟时橙红或紫红色。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔600 ~ 2200米的森林中。

分布：产华北、西北、华东、华中、西南等地。

观赏及其他用途：树形优美，初夏开花，白色总苞片覆盖满树，甚为美观，可用于庭院观赏树种；果味甜可食。

槲寄生

Viscum coloratum

槲寄生科，槲寄生属。灌木，高0.3 ~ 0.8米，雌雄异株；茎、枝均圆柱状，二歧或三歧，节稍膨大。叶对生，稀3枚轮生，厚革质或革质；基出脉3 ~ 5条；叶柄短。雌雄异株；花序顶生或腋生于茎叉状分枝处；雄花序聚伞状，通常具花3朵；雌花序聚伞式，具花3 ~ 5朵。果球形，成熟时淡黄色或橙红色，果皮平滑。

花期：4 ~ 5月。

生境：寄生于多种植物的枝干上。

分布：广布于全国（除新疆、西藏、云南、广东外）。

观赏及其他用途：全株可入药。

筒鞘蛇菰

Balanophora involucrata

蛇菰科，蛇菰属。草本，高5 ~ 15厘米；根茎肥厚，近球形，不分枝或偶分枝，黄褐色，很少呈红棕色，表面密集颗粒状小疣瘤和浅黄色或黄白色星芒状皮孔。花茎长3 ~ 10厘米，大部呈红色，少黄红色。花雌雄异株；花序均呈卵球形；雄花较大，直径约4毫米，3数；雌花子房卵圆形，有细长的花柱和子房柄。

花期：7 ~ 8月。

生境：生长于海拔2300 ~ 3600米云杉、铁杉和栎木林中。

分布：产西藏、四川、云南、贵州、湖南。

观赏及其他用途：形态奇特，色彩鲜艳；全株可入药。

泽漆

Euphorbia helioscopia

大戟科，大戟属。一年生草本。茎直立，单一或自基部多分枝，高10 ~ 30厘米，光滑无毛。叶互生，倒卵形或匙形，先端具牙齿。多歧聚伞花序；总苞钟状，雄花数枚，明显伸出总苞外；雌花1枚，子房柄略伸出总苞边缘。蒴果三棱状阔圆形，光滑，无毛；具明显的三纵沟。

花期：4 ~ 10月。

生境：生于山沟、路旁、荒野和山坡，较常见。

分布：广布于全国（除黑龙江、吉林、内蒙古、广东、海南、台湾、新疆、西藏外）。

观赏及其他用途：常见杂草，极富野趣；全株入药，有毒，不可内服。

瓜子金

Polygala japonica

远志科，远志属。多年生草本，高15 ~ 20厘米；茎绿褐色或绿色，具纵棱，被卷曲短柔毛。单叶互生，叶片厚纸质或亚革质，卵形或卵状披针形，全缘。总状花序与叶对生，或腋外生，花梗细；花瓣3，白色至紫色，基部合生，侧瓣长圆形，基部内侧被短柔毛，龙骨瓣舟状，具流苏状附属物。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于海拔2000米以下的山坡草地或田埂上。

分布：产东北、华北、西北、华东、华中和西南地区。

观赏及其他用途：株形小巧，花色艳丽；全草可入药。

野鸦椿

Euscaphis japonica

省沽油科，野鸦椿属。落叶小乔木或灌木，高2 ~ 6米，树皮灰褐色，具纵条纹，小枝及芽红紫色。叶对生，奇数羽状复叶，小叶5 ~ 9，厚纸质，长卵形或椭圆形，边缘具疏锯齿，齿尖有腺体。圆锥花序顶生，花黄白色，萼片与花瓣均5，椭圆形，萼片宿存，花盘盘状。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔100 ~ 1600米的山谷、坡地、路旁及杂木林中。

分布：除西北各省外，全国均产。

观赏及其他用途：花小巧，果红艳美丽，可栽培作园林观赏树木；根及果入药。

玫红省沽油

Staphylea holocarpa var. *rosea*

省沽油科，省沽油属。落叶灌木或小乔木，高3 ~ 10米，幼枝平滑。三小叶，小叶近革质，无毛，长圆状披针形至狭卵形，基部钝，先端突渐尖，边缘有硬细锯齿。具广展伞房花序，花玫瑰红色，叶后开放。果为3裂、梨形膨大的蒴果。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于海拔700 ~ 2400米的石灰岩山谷坡地的落叶林中。

分布：湖北、四川、云南。

观赏及其他用途：花晶莹剔透，泛玫瑰红色，观赏效果极好。

倒地铃

Cardiospermum halicacabum

无患子科，倒地铃属。草质攀援藤本；茎、枝绿色，有5或6棱和同数的直槽，棱上被皱曲柔毛。二回三出复叶，轮廓为三角形；小叶近无柄，薄纸质，卵形或长椭圆形，边缘有疏锯齿或羽状分裂。圆锥花序腋生，萼片4，花小，乳白色，花瓣4，2大2小，倒卵形。蒴果膜质，梨形、陀螺状倒三角形。

花期：6 ~ 9月。

生境：生长于田野、灌丛、路边和林缘。

分布：分布于长江以南各省区。

观赏及其他用途：蒴果可爱讨巧；全株可入药。



臭节草

Boenninghausenia albiflora

芸香科，石椒草属。常绿草本，枝、叶灰绿色。叶薄纸质，小裂片倒卵形、菱形或椭圆形，背面灰绿色，老叶常变褐红色。花序有花甚多，花枝纤细，基部有小叶；花瓣白色，有时顶部桃红色，长圆形或倒卵状长圆形，长6～9毫米，有透明油点；8枚雄蕊长短相间，花丝白色，花药红褐色。

花期：7～11月。

生境：生于海拔500～2800米的山地草丛中或疏林下。

分布：分布于长江以南各省区。

观赏及其他用途：叶形秀气，花可爱，可栽培于林缘观赏；全株入药；茎、叶含精油。

山酢浆草

Oxalis griffithii

酢浆草科，酢浆草属。多年生草本，高8 ~ 10厘米。茎不明显。叶基生；小叶3，倒三角形或宽倒三角形。花单生，花瓣5，淡紫色或白色，长椭圆形，先端钝；雄蕊10枚，5长5短，花丝基部合生。蒴果椭圆形或近球形。

花期：3 ~ 4月。

生境：生于海拔800 ~ 3000米的密林、灌丛和沟谷等阴湿处。

分布：分布于华东、华中、西南、陕西和甘肃。

观赏及其他用途：植株小巧，花色淡雅，可作为林下观赏植物；全草入药。

野老鹳草

Geranium carolinianum

牻牛儿苗科，老鹳草属。一年生草本，高20 ~ 60厘米，茎直立或仰卧，单一或多数，具棱角，密被倒向短柔毛。基生叶早枯，茎生叶互生或最上部对生；叶片圆肾形，掌状裂至近基部，下部楔形、全缘，上部羽状深裂。花序腋生和顶生，每总花梗具2花，顶生总花梗常数个集生，花序呈伞形状；花瓣淡紫红色，倒卵形。

花期：4 ~ 7月。

生境：生于平原和低山荒坡杂草丛中。

分布：分布于华东、华中和西南部分省区。

观赏及其他用途：低海拔常见杂草；全草入药。

毛蕊老鹳草

Geranium platyanthum

牻牛儿苗科，老鹳草属。多年生草本，高30 ~ 80厘米。茎直立，单一。叶基生和茎上互生；叶片五角状肾圆形，掌状5裂达叶片中部或稍过之，裂片菱状卵形或楔状倒卵形，下部全缘，上部边缘具不规则牙齿状缺刻。花序通常为伞形聚伞花序，总花梗具2 ~ 4花；花瓣淡紫红色，宽倒卵形或近圆形，常向上反折。

花期：6 ~ 7月。

生境：生于山地林下、灌丛和草甸。

分布：东北、华北、西北、湖北及四川等省。

观赏及其他用途：花色艳丽，可栽培于花境中或成片栽培供观赏。

牯岭凤仙花

Impatiens davidii

凤仙花科，凤仙花属。一年生草本，高可达90厘米。茎粗壮，有分枝。叶互生；叶片膜质，卵状长圆形或卵状披针形，边缘有粗圆齿。总花梗仅具1花，花淡黄色；旗瓣近圆形，背面中肋具绿色鸡冠状突起，翼瓣具柄，唇瓣囊状，具黄色条纹，基部急狭成长约8毫米钩状的距，距端2浅裂。

花期：7～9月。

生境：生于海拔300～700米的山谷林下或草丛潮湿处。

分布：产华东及华中部分省区。

观赏及其他用途：花大色靓丽，可播种于林下阴湿处观赏。

天目山凤仙花

Impatiens tienmushanica

凤仙花科，凤仙花属。一年生草本，高40 ~ 50厘米，全株无毛。茎下部节膨大。叶互生，具柄；叶片膜质，长圆形或卵状椭圆形，边缘有圆齿状锯齿，齿端具小尖。总花梗单生于上部叶腋，具5 ~ 7花，花较大，淡紫色，花梗细，旗瓣近圆形，唇瓣漏斗状，基部渐狭成长约10毫米，内弯，顶端2浅裂的距。

花期：7 ~ 9月。

生境：生于山坡林下岩石旁潮湿处。海拔300 ~ 900米。

分布：产浙江。

观赏及其他用途：花形可爱，花色美丽，极具观赏价值的野生花卉。

绿萼凤仙花

Impatiens chlorosepala

凤仙花科，凤仙花属。一年生草本，高30 ~ 40厘米。茎肉质，直立。叶常密集于茎上部，互生，具柄；叶片膜质，长圆状卵形或披针形，边缘具圆齿状齿，齿间具小尖。总花梗生于上部叶腋，具1 ~ 2花；花大，淡红色，侧生萼片绿色，旗瓣圆形，兜状，具狭龙骨状突起；唇瓣檐部漏斗状，基部急狭成长2 ~ 2.5厘米，弯曲且内卷的距。

花期：10 ~ 12月。

生境：生于海拔300 ~ 1300米的山谷水旁阴处或疏林溪旁。

分布：广东、广西、贵州、重庆。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，可栽培于潮湿的溪沟边观赏。

华凤仙

Impatiens chinensis

凤仙花科，凤仙花属。一年生草本，高30 ~ 60厘米。茎纤细，上部直立，下部横卧。叶对生，无柄或几无柄；叶片硬纸质，线形或线状披针形，边缘疏生刺状锯齿。花较大，单生或2 ~ 3朵簇生于叶腋，无总花梗，紫红色或白色；侧生萼片2，线形，旗瓣圆形，唇瓣漏斗状，长约15毫米，具条纹，基部渐狭成内弯或旋卷的长距。

花期：6 ~ 10月。

生境：常生于海拔100 ~ 1200米的池塘、水沟旁、田边或沼泽地。

分布：产华东、华南及云南省。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，可成片栽培于湿地旁；全草可入药。

伞形科

直刺变豆菜

Sanicula orthacantha

伞形科，变豆菜属。多年生草本，高8 ~ 35厘米。基生叶圆心形或心状五角形，掌状3全裂。茎生叶略小于基生叶，有柄，掌状3全裂。花序通常2 ~ 3分枝，小伞形花序有花6 ~ 7，雄花5 ~ 6，通常5；花瓣白色、淡蓝色或紫红色，倒卵形，花丝略长于花瓣；两性花1，无柄；萼齿和花瓣形状同雄花。

花期：4 ~ 9月。

生境：生于海拔260 ~ 3200米的山涧林下、路旁、沟谷及溪边等处。

分布：产华北、华东、华中、华南、西南等地。

观赏及其他用途：株形秀气，花色彩淡雅，可种于阴湿处作地被；全草药用。

紫花前胡

Angelica decursiva

伞形科，当归属。多年生草本。茎高1～2米，常为紫色，有纵沟纹。根生叶和茎生叶有长柄，基部膨大成圆形的紫色叶鞘，抱茎；叶片三角形至卵圆形，坚纸质，一回三全裂或一至二回羽状分裂。复伞形花序顶生和侧生；总苞片卵圆形；花深紫色，花瓣倒卵形或椭圆状披针形，花药暗紫色。

花期：8～9月。

生境：生于山坡林缘、溪沟边或杂木林灌丛中。

分布：产东北、华北、华东、华中、华南、西南等地。

观赏及其他用途：可栽培作地被观赏；根称前胡，入药。

五岭龙胆

Gentiana davidii

龙胆科，龙胆属。多年生草本，高5 ~ 15厘米。主茎粗壮，发达，有多数较长分枝。叶线状披针形或椭圆状披针形，先端钝，基部渐狭，边缘微外卷。花多数，簇生枝端呈头状，被包围于最上部的苞叶状的叶丛中；无花梗；花冠蓝色，无斑点和条纹，狭漏斗形。

花期：8 ~ 11月。

生境：生于海拔350 ~ 2500米的山坡草丛、山坡路旁、林缘、林下。

分布：华东、华南及湖南等省。

观赏及其他用途：蓝色小花十分美丽，可作林下地被观赏。

深红龙胆

Gentiana rubicund

龙胆科，龙胆属。一年生草本，高8 ~ 15厘米。茎直立，紫红色或草黄色。基生叶排列成幅状，卵圆形，全缘，长1 ~ 2厘米；茎生叶与基生叶同形，长约0.7厘米，排列稀疏。花数朵，单生于小枝顶端；花冠紫红色，有时冠筒上具黑紫色短而细的条纹和斑点，倒锥形，裂片卵形。

花期：3 ~ 10月。

生境：生于海拔520 ~ 3300米的荒地、路边、溪边、山坡草地、林下、岩石边及山沟。

分布：产西南、华中部分省区及甘肃东南部。

观赏及其他用途：西南地区常见野花，色彩亮丽，富有野趣。

喉毛花

Comastoma pulmonarium

龙胆科，喉毛花属。一年生草本，高5 ~ 30厘米。茎直立，单生，草黄色，近四棱形，具分枝，稀不分枝。基生叶少数，无柄，矩圆形或矩圆状匙形；茎生叶无柄，卵状披针形，茎上部及分枝上叶变小。聚伞花序或单花顶生；花5数；花萼开张，深裂近基部；花冠淡蓝色，具深蓝色纵脉纹，筒形或宽筒形；喉部具一圈白色副冠。

花期：7 ~ 11月。

生境：生于海拔3000 ~ 4800米的河滩、山坡草地、林下、灌丛及高山草甸。

分布：产西南及西北。

观赏及其他用途：花形及花色俱美，是极具观赏价值的高山野花。

大钟花

Megacodon stylophorus

龙胆科，大钟花属。多年生草本，高30 ~ 100厘米，全株光滑。茎直立，粗壮，黄绿色，中空，近圆形，具细棱形。基部2 ~ 4对叶小，膜质，卵形；中、上部叶大，草质，绿色，先端钝，基部钝或圆形，半抱茎。花2 ~ 8朵，顶生及叶腋生，组成假总状聚伞花序；花冠黄绿色，有绿色和褐色网脉，钟形。

花期：6 ~ 9月。

生境：生于海拔3000 ~ 4400米的林间草地、林缘、灌丛中、山坡草地及水沟边。

分布：产西南高海拔地区。

观赏及其他用途：株形高大，花朵硕大美丽，可开发作为园林观赏花卉。

牛皮消

Cynanchum auriculatum

萝摩科，鹅绒藤属。蔓性半灌木；茎圆形，被微柔毛。叶对生，膜质，被微毛，宽卵形至卵状长圆形。聚伞花序伞房状，着花30朵；花萼裂片卵状长圆形；花冠白色，辐状，裂片反折，内面具疏柔毛；副花冠浅杯状，裂片椭圆形，肉质，钝头。

花期：6 ~ 9月。

生境：生于从低海拔的沿海地区直到3500米高的山坡林缘及路旁灌木丛中或河流、水沟边潮湿地。

分布：产华北、华东、华中、华南、西南。

观赏及其他用途：块根可入药。

竹灵消

Cynanchum inamoenum

萝摩科，鹅绒藤属。直立草本，基部分枝多；茎干中空，被单列柔毛。叶薄膜质，广卵形，对生。伞形聚伞花序腋生，着花8 ~ 10朵；花黄色，长和直径约3毫米；花萼裂片披针形，急尖，近无毛；花冠辐状，无毛，裂片卵状长圆形，钝头；副花冠较厚，裂片三角形，短急尖。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔3500米以下的山地疏林、灌木丛中或山顶、山坡草地上。

分布：产东北、华北、华东、华中、西南。

观赏及其他用途：可栽培供观赏；根可药用。

龙葵

Solanum nigrum

茄科，茄属。一年生直立草本，高0.3 ~ 1米，茎无棱或棱不明显，绿色或紫色，近无毛或被微柔毛。叶卵形，全缘或每边具不规则的波状粗齿。蝎尾状花序腋外生，由3 ~ 6花组成，花冠白色，筒部隐于萼内，冠檐5深裂，裂片卵圆形。浆果球形，熟时黑色。

花期：5 ~ 8月。

生境：喜生于田边，荒地及村庄附近。

分布：全国几乎均有分布。

观赏及其他用途：田间地头或城市常见杂草；嫩茎叶在部分地区常做野菜食用，有一定毒性，不宜多食。

白英

Solanum lyratum

茄科，茄属。草质藤本，长0.5 ~ 1米，茎及小枝均密被具节长柔毛。叶互生，多数为琴形，基部常3 ~ 5深裂，裂片全缘；两面均被白色发亮的长柔毛。聚伞花序顶生或腋外生，疏花，花冠蓝紫色或白色，花冠筒隐于萼内。浆果球状，熟时红色。

花期：6 ~ 9月。

生境：生于海拔600 ~ 2800米的山谷草地或路旁、田边，住宅附近。

分布：产西北、华北、华东、华中、华南、西南。

观赏及其他用途：全草可入药。

茄参

Mandragora caulescens

茄科，茄参属。多年生草本，高20 ~ 60厘米，全体被短柔毛。茎上部常分枝。叶在茎上端不分枝时簇集，倒卵状矩圆形至矩圆状披针形。花单独腋生，通常多花同叶集生于茎端似簇生；花梗粗壮，花冠辐状钟形，暗紫色，5中裂。浆果球状，多汁液。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔2200 ~ 4200米的山坡草地。

分布：产四川、云南和西藏。

观赏及其他用途：根可药用。

红丝线

Lycianthes biflora

茄科，红丝线属。灌木或亚灌木，高0.5 ~ 1.5米。上部叶常假双生，大小不等，大叶片椭圆状卵形，偏斜，小叶片宽卵形，两种叶均膜质全缘。花序无梗，通常2 ~ 3花着生于叶腋内，花梗短，花冠淡紫色或白色，星形，花冠筒隐于萼内，基部具斑点，花冠深5裂，裂片披针形。浆果球形，成熟时绯红色。

花期：5 ~ 8月。

生境：生于海拔150 ~ 2000米的荒野阴湿地、林下、路旁、水边及山谷中。

分布：华东、华南、西南大部省区。

观赏及其他用途：果红艳美丽，观赏性较强；全株可入药。

篱栏网

Merremia hederacea

旋花科，鱼黄草属。缠绕或匍匐草本。茎细长，有细棱。叶心状卵形，全缘或通常具不规则的粗齿或锐裂齿，有时为深或浅3裂。聚伞花序腋生，有3 ~ 5朵花；花冠黄色，钟状，具5条脉，外面无毛，内面近基部具长柔毛。蒴果扁球形或宽圆锥形，4瓣裂，果瓣有皱纹。

花期：8 ~ 11月。

生境：生于海拔100 ~ 800米的灌丛或路旁草丛。

分布：产长江以南部分省区。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，可作野花观赏；全草和种子可入药。

飞蛾藤

Dinetus racemosus

旋花科，飞蛾藤属。多年生草质藤本，茎缠绕，圆柱形。叶卵形，先端渐尖或尾状，具钝或锐尖的尖头，基部深心形。圆锥花序腋生，多花，花冠漏斗形，长约1厘米，白色，管部带黄色，无毛，5裂至中部，裂片开展，长圆形。

花期：8 ~ 9月。

生境：多生于海拔850 ~ 2000米的灌丛、林缘。

分布：我国长江以南各省及陕西、甘肃均有分布。

观赏及其他用途：花序硕大，花洁白美丽，秋季常见野花；全草可入药。

三裂叶薯

Ipomoea triloba

旋花科，番薯属。草本；茎缠绕或有时平卧，无毛或散生毛。叶宽卵形至圆形，全缘或有粗齿或深3裂，基部心形。花序腋生，1朵花或数朵成伞形状聚伞花序；花冠漏斗状，长约1.5厘米，无毛，淡红色或淡紫红色，冠檐裂片短而钝，有小短尖头。蒴果近球形。

花期：7 ~ 9月。

生境：生于中低海拔的丘陵路旁、荒草地或田野、抛荒地。

分布：原产热带美洲，我国长江以南常见逸生杂草。

观赏及其他用途：花粉红可爱，常见野花；可作牲畜饲料。

睡菜

Menyanthes trifoliata

睡菜科，睡菜属。多年生沼生草本。匍匐状根状茎粗大，节上有膜质鳞片形叶。叶基生，挺出水面，三出复叶，小叶椭圆形，全缘或边缘微波状。花莛由根状茎顶端鳞片形叶腋中抽出；总状花序多花；花5数；花冠白色，筒形，上部内面具白色长流苏状毛，其余光滑，裂片椭圆状披针形。

花期：5 ~ 7月。

生境：生长于海拔450 ~ 3600米的沼泽中，常成群落生长。

分布：东北、西南及浙江、河北省。

观赏及其他用途：可用于湿地、沼泽地绿化；全草可入药。

梓木草

Lithospermum zollingeri

紫草科，紫草属。多年生匍匐草本。匍匐茎长可达30厘米，有开展的糙伏毛；茎直立，高5 ~ 25厘米。基生叶有短柄，叶片倒披针形或匙形；茎生叶与基生叶同形而较小。花序有花1至数朵，花冠蓝色或蓝紫色，喉部有5条向筒部延伸的纵褶，雄蕊着生纵褶之下。

花期：5 ~ 8月。

生境：生于丘陵或低山草坡或灌丛下。

分布：产华东、西南及西北部分省区。

观赏及其他用途：花形色俱佳，可栽培于花境中供观赏；果实可入药。

倒提壶

Cynoglossum amabile

紫草科，琉璃草属。多年生草本，高15 ~ 60厘米。茎单一或数条丛生，密生贴伏短柔毛。基生叶具长柄，长圆状披针形或披针形，茎生叶长圆形或披针形。花序锐角分枝，分枝紧密；花冠通常蓝色，稀白色，裂片圆形，喉部具5个梯形附属物。

花期：5 ~ 8月。

生境：生于海拔1200 ~ 4500米山坡草地、山地灌丛、干旱路边及针叶林缘。

分布：产西南中高海拔山区及甘肃南部。

观赏及其他用途：花色艳丽，常成片开放，充满野趣；植株还可入药。

海州常山

Clerodendron trichotomum

马鞭草科，大青属。灌木或小乔木，高1.5 ~ 10米；老枝灰白色，具皮孔，髓白色，有淡黄色薄片状横隔。叶片纸质，卵形至三角状卵形。伞房状聚伞花序顶生或腋生，花萼蕾时绿白色，后紫红色，基部合生，中部略膨大，有5棱脊，顶端5深裂；花冠白色或带粉红色，花丝长，伸出花冠外。

花期：6 ~ 10月。

生境：生于海拔2400米以下的山坡灌丛中。

分布：产于华北、中南、西南、西北部分省区及辽宁。

观赏及其他用途：花萼及花被都具有一定观赏性，满树开放时蔚为壮观，果时也极为美丽。

单花莸

Caryopteris nepetifolia

马鞭草科，莸属。多年生草本，有时蔓生，仅基部木质化，高30 ~ 60厘米；茎方形，被下弯柔毛。叶片纸质，宽卵形至近圆形。单花腋生，花冠淡蓝色，外面疏生细毛和腺点，喉部通常被柔毛；雄蕊4枚，与花柱均伸出花冠管外，子房密生绒毛。

花期：4 ~ 7月。

生境：生阴湿山坡、林边、路旁或水沟边。

分布：产华东各省区。

观赏及其他用途：可栽培于林缘或花境中观赏；全草可药用。

金疮小草

Ajuga decumbens

唇形科，筋骨草属。一或二年生草本，平卧或上升，具匍匐茎，茎长10 ~ 20厘米。基生叶较多，较茎生叶长而大，叶片薄纸质，匙形或倒卵状披针形。轮伞花序多花，排列成间断的穗状花序，花梗短。花冠白色，具紫脉，花冠筒挺直，基部略膨大。

花期：3 ~ 7月。

生境：生于海拔360 ~ 1400米的溪边、路旁及湿润的草坡上。

分布：产长江以南各省区。

观赏及其他用途：可栽培于花境中观赏；全草可入药。

毛药花

Bostrychanthera deflexa

唇形科，毛药花属。草本，高0.5 ~ 1.5米。茎四棱形，具深槽，密被倒向短硬毛。叶几无柄，长披针形，纸质，边缘为粗锯齿或浅齿状。聚伞花序具7 ~ 11花，花冠淡紫红色，直伸，外面被极疏的长硬毛。成熟小坚果1枚，黑色，近球形。

花期：7 ~ 9月。

生境：生于海拔500 ~ 1100米的密林下湿润处。

分布：产华东、华中、华南及西南部分省区。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，植株壮硕，观赏价值高，可作林下地被使用。

野芝麻

Lamium barbatum

唇形科，野芝麻属。多年生植物。茎四棱形，具浅槽，中空，几无毛。茎下部的叶卵圆形或心脏形，上部的叶卵圆状披针形，较茎下部的叶为长而狭。轮伞花序着生于茎端；花冠白或浅黄色。小坚果倒卵圆形，先端截形。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔2600米以下的路边、溪旁、田埂及荒坡上。

分布：产全国大部省区。

观赏及其他用途：可栽培于林下或溪沟边作林下地被观赏；还可入药。

水苏

Stachys japonica

唇形科，水苏属。多年生草本，高20 ~ 80厘米。茎单一，直立，四棱形，具槽，在棱及节上被小刚毛，余部无毛。茎叶长圆状宽披针形，叶柄明显；苞叶披针形，无柄。轮伞花序6 ~ 8花，花冠粉红或淡红紫色，花萼5齿，等大，三角状披针形，冠筒几不超出萼。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔500米以下的水沟、河岸、抛荒水田等湿地上。

分布：华北、华中、华东及辽宁等省。

观赏及其他用途：株形秀气，花可爱美丽，可栽培于湿地或林下阴湿处观赏；全草可入药。

石荠苎

Mosla scabra

唇形科，石荠苎属。一年生草本。茎高20 ~ 100厘米，茎、枝均四棱形，密被短柔毛。叶卵形或卵状披针形，边缘近基部全缘，自基部以上为锯齿状，纸质。总状花序生于主茎及侧枝上，花冠粉红色，内面基部具毛环，外面被微柔毛。

花期：5 ~ 11月。

生境：生于海拔50 ~ 1150米的山坡、路旁、田间或灌丛下。

分布：产全国大部省区。

观赏及其他用途：花小巧美丽，常见野花；全草可入药。



香薷

Elsholtzia cliliata

唇形科，香薷属。草本，高0.5 ~ 1米。茎四棱形，具槽，槽内被疏生或密集的白色短柔毛。叶卵状披针形或椭圆状披针形。轮伞花序组成穗状花序生于茎、枝顶端一侧；花冠红紫色，外面被白色柔毛。

花期：9 ~ 11月。

生境：生于海拔200 ~ 1200米的山坡灌丛中、林下、溪旁及河边草地。

分布：产华东、华中、华南及西南大部省区。

观赏及其他用途：株形紧凑，花色艳丽，可成片或数丛栽培于林缘或林下供观赏；也可作香料植物。

四轮香

Hanceola sinensis

唇形科，四轮香属。多年生草本，具肥大横走的木质根茎。茎直立，四棱形，具槽，被微柔毛，高50 ~ 150厘米。叶披针形至倒卵圆状披针形。轮伞花序数花，花冠白、黄至紫色，冠筒弧曲状，基部细小，大部伸出花萼。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔1200 ~ 2200米的亚热带常绿林或混交林下。

分布：产四川、云南、贵州、广西、湖南等省。

观赏及其他用途：花色艳丽，可栽培于林下作地被观赏。

流苏树

Chionanthus retusus

木犀科，流苏树属。落叶灌木或乔木，高达20米。小枝圆柱形，开展，无毛，幼枝淡黄色或褐色。叶片纸质或薄革质，长圆形至圆形，全缘或有小锯齿。聚伞状圆锥花序，顶生于枝端；花冠白色，4深裂，裂片线状倒披针形，花冠管极短。

花期：3 ~ 6月。

生境：生于海拔3000米以下的稀疏混交林中或灌丛中，山坡、河边也常有分布。

分布：产华北、西北、华东、华南、西南部分省区。

观赏及其他用途：花开放时洁白一片，十分壮观；花、嫩叶晒干可代茶，味香；果可榨芳香油。



辽东丁香

Syringa wolfii

木犀科，丁香属。直立灌木，高达6米。枝粗壮，无毛，疏生白色皮孔。叶片椭圆状长圆形至倒卵状长圆形。圆锥花序直立，由顶芽抽出；花芳香，花冠紫色、淡紫色、紫红色或深红色，漏斗状，裂片近直立或开展，不反折，长圆状卵形至卵形。

花期：6月。

生境：生于海拔500 ~ 1600米的山坡杂木林、灌丛中、林缘或河边。

分布：产东北、西北大部省区。

观赏及其他用途：花秀雅，可栽培于庭园中供观赏。

毛蕊花

Verbascum thapsus

玄参科，毛蕊花属。二年生草本，高可达2米，全株被密而厚的浅灰黄色星状毛。基生叶和下部的茎生叶倒披针状矩圆形，上部茎生叶逐渐缩小而渐变为矩圆形至卵状矩圆形。穗状花序圆柱状，花密集，数朵簇生在一起，花梗很短；花冠黄色，直径1～2厘米，雄蕊5。

花期：6～8月。

生境：生于海拔1400～3200米的山坡草地、河岸草地、道路旁。

分布：分布于新疆、西藏、云南、四川。

观赏及其他用途：植株高大，全株毛茸状，花色艳丽，可栽培于庭园或公园中供观赏。

天目地黄

Rehmannia chingii

玄参科，地黄属。多年生草本，植体被多细胞长柔毛，高30 ~ 60厘米，茎单出或基部分枝。基生叶多少莲座状排列，叶片椭圆形，茎生叶外形与基生叶相似，向上渐缩小。花单生于叶腋，连同花梗总长超过苞片；花冠紫红色，外面被多细胞长柔毛。蒴果卵形。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于拔海190 ~ 500米的山坡、路旁草丛或石缝中。

分布：分布于浙江、安徽。

观赏及其他用途：花大色艳，可栽培于庭园或岩石园中观赏；全草可入药。

阿拉伯婆婆纳

Veronica persica

玄参科，婆婆纳属。一年生小草本，铺散多分枝。茎密生两列多细胞柔毛。叶2 ~ 4对，具短柄，卵形或圆形。总状花序很长；苞片互生，与叶同形且几乎等大；花冠蓝色、紫色或蓝紫色，偶见白色，裂片卵形至圆形，喉部疏被毛。

花期：3 ~ 5月。

生境：路边及荒野常见归化杂草。

分布：原产西亚及欧洲，逸生于黄河以南各省区。

观赏及其他用途：花小巧，色彩淡雅，常成片开放，富有野趣。

长腺小米草

Euphrasia hirtella

玄参科，小米草属。一年生草本，植株直立，高3 ~ 40厘米，通常细弱，少粗壮，不分枝或少有上半部分枝，各部分有顶端为头状的长腺毛与其他毛混生。叶和苞叶无柄，卵形至圆形。花序有花数朵，裂片披针形至钻形；花冠白色或上唇淡紫色。蒴果矩圆状。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于草甸、草原、林缘及针叶林中。

分布：分布于新疆、黑龙江、吉林。

观赏及其他用途：花色淡雅，小巧可爱。

沙氏鹿茸草

Monochasma savatieri

玄参科，鹿茸草属。多年生草本，高15 ~ 23厘米，全体密被绵毛而呈灰白色。茎多数，丛生，基部多倾卧或弯曲，老时木质化，通常不分枝。叶交互对生，下方鳞片状，向上则逐渐增大，长圆状披针形至线状披针形。总状花序顶生；花冠淡紫色或几乎白色，二唇形，上唇盔状，弯曲2裂，下唇3裂，中裂片稍大。

花期：3 ~ 4月。

生境：生于山坡向阳处林下或草丛中，常见于马尾松林下。

分布：产华东部分省区。

观赏及其他用途：全株银白色，花美丽，具有较高的观赏性；全草可药用。

大卫氏马先蒿

Pedicularis davidii

玄参科，马先蒿属。多年生草本，密被短毛。茎基部稍木质化，具明显的棱角。叶茂密，下部的多假对生，上部的互生，叶片膜质，卵状长圆形至披针状长圆形，羽状全裂，裂片再浅裂至中裂。总状花序顶生，花冠紫色或红色，盔的直立部分在自身的轴上扭转两整转，且强烈扭折使喙卷成半环形。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于海拔1600 ~ 3500米的沟边、路旁及草坡上。

分布：产甘肃、陕西及四川。

观赏及其他用途：花形态奇特，色彩鲜艳美丽，极具观赏价值。



华马先蒿

Pedicularis oederi var.sinensis

玄参科，马先蒿属。多年生矮小草本，高5 ~ 10厘米，叶基生或在茎上有数叶互生，叶片线状披针形至线形，一回羽状深裂至全裂。花序顶生，苞片披针形至线状披针形，花冠多二色，盔端紫黑色，其余黄白色，有时下唇及盔的下部亦有紫斑。蒴果长卵形至卵状披针形。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于海拔2600 ~ 4300米以上的高山沼泽、草甸和阴湿的林下。

分布：分布于河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川、云南。

观赏及其他用途：花色鲜艳，点缀于高山草丛中十分美丽。

穗花马先蒿

Pedicularis spicata

玄参科，马先蒿属。一年生草本，高30 ~ 45厘米，多分枝，被白色柔毛。基生叶花时已枯；茎生叶4枚轮生，3 ~ 6轮，叶片长圆状披针形至线状披针形，羽状浅裂至中裂。穗状花序顶生，苞片下部叶状，中部至上部菱状卵形至广卵形。花冠紫红色，盔指向前上方，额高凸。

花期：6 ~ 9月。

生境：生于海拔1500 ~ 2600米的草地、溪流旁及灌丛中。

分布：产湖北、西南、西北、华北、东北。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，分布较广的野花。

藓生马先蒿

Pedicularis muscicola

玄参科，马先蒿属。多年生草本，根粗壮，有分枝。茎丛生，柔弱，分枝多而细长，铺地生长，长达20厘米。叶互生，叶片椭圆形至披针形，羽状全裂，裂片常互生。花腋生，自基部即开始着生，萼圆筒形，花冠玫瑰红色，盔扭折至顶部向下，前方渐细为卷曲或S形的长喙。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔1500 ~ 3000米的杂木林、冷杉林的苔藓层中或山坡阴湿处。

分布：产山西、陕西、甘肃、青海及湖北。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，具有较高的观赏价值；根可入药。

白花列当

Orobanche alba

列当科，列当属。寄生草本，全株被短腺毛。茎直立，较粗壮，基部棍棒状增粗。叶卵状披针形或披针形，连同苞片、花萼及花冠裂片外面和边缘密被腺毛。花序穗状，花冠钟状，淡黄色、黄色或黄褐色，少有白色，筒部膨大，上唇全缘或稍微凹，下唇稍短于上唇，3裂。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔2500 ~ 3700米的山坡及路旁，寄生于亚菊属植物根上。

分布：产四川和西藏。

观赏及其他用途：花美丽，奇特的寄生植物。



叶片不为绿色，全株被短腺毛

苦苣苔

Conandron ramondioides

苦苣苔科，苦苣苔属。多年生草本。根状茎短，芽密被黄褐色长柔毛。叶1～2，有长或短柄；叶片草质或薄纸质，椭圆形或椭圆状卵形，边缘有不整齐锯齿。聚伞花序1条，2～3回分枝，苞片对生，线形；花冠紫色，裂片5，三角状狭卵形。蒴果狭卵球形或长椭圆球形。

花期：6月。

生境：生于海拔500～1000米的山谷溪边石上、山坡林中石壁上阴湿处。

分布：华东地区及台湾省。

观赏及其他用途：可栽培于岩石园观赏；全草可入药。

降龙草

Hemiboea subcapitata

苦苣苔科，半蒴苣苔属。多年生草本。茎高10 ~ 40厘米，肉质，不分枝，具4 ~ 7节。叶对生；叶片稍肉质，椭圆形至倒卵状披针形，全缘或中部以上具浅钝齿。聚伞花序腋生或假顶生，总苞球形，花冠白色，具紫斑，外面疏生腺状短柔毛，上唇2浅裂，下唇3浅裂。蒴果线状披针形。

花期：8 ~ 9月。

生境：生于海拔100 ~ 2100米的山谷林下石上、林下或沟边阴湿处。

分布：产华东、华中、华南、西南各省区。

观赏及其他用途：可栽培做地被观赏，也可盆栽；全草药用；可作猪饲料。

吊石苣苔

Lysionotus pauciflorus

苦苣苔科，吊石苣苔属。小灌木。茎长7 ~ 30厘米。叶3枚轮生，有时对生或4枚轮生；叶片革质，线形至倒卵状长圆形，边缘在中部以上或上部有少数牙齿或小齿，有时近全缘。聚伞花序有1 ~ 3花；花序梗纤细，苞片披针状线形，花冠白色带淡紫色或淡紫色条纹，上唇2浅裂，下唇3裂，筒细漏斗状。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔300 ~ 2000米的丘陵或山地林中或阴处石崖上或树上。

分布：产华东、华中、华南、西南及陕西省。

观赏及其他用途：花可爱且色彩美丽，耐干旱，耐阴，可开发作为室内盆栽观赏；全株可入药。

浙皖粗筒苣苔

Briggsia chienii

苦苣苔科，粗筒苣苔属。叶全部基生，有柄；叶片椭圆状长圆形或狭椭圆形，边缘有锯齿，上面密被灰白色贴伏短柔毛，下面沿隆起网脉密被锈色绵毛。聚伞花序2次分枝，每花序具1～5花，苞片2，狭倒卵形至线状披针形；萼5裂至基部，有时裂至中部；花冠紫红色，内面具紫色斑点，上唇2深裂，下唇3裂至中部。

花期：9～10月。

生境：生于海拔500～1000米的潮湿岩石上及草丛中。

分布：产浙江、安徽及江西。

观赏及其他用途：花朵硕大美丽，可盆栽观赏，也可栽培于岩石园。

叶背沿脉密被锈色绵毛

牛耳朵

Chirita eburnea

苦苣苔科，唇柱苣苔属。具粗根状茎。叶均基生，肉质；叶片卵形或狭卵形，边缘全缘。聚伞花序2 ~ 6条，不分枝或一回分枝；苞片2，对生，卵形、宽卵形或圆卵形；花萼5裂达基部，裂片狭披针形；花冠紫色或淡紫色，有时白色，喉部黄色。

花期：4 ~ 7月。

生境：生于海拔100 ~ 1500米的石灰山林中石上或沟边林下。

分布：产华中、华南及西南部分省区。

观赏及其他用途：叶肥厚，花鲜艳美丽，极好的盆栽观赏植物。



闽赣长蒴苣苔

Didymocarpus heucherifolius

苦苣苔科，长蒴苣苔属。具粗根状茎。叶5 ~ 6，均基生；叶片纸质，心状圆卵形或心状三角形，顶端微尖，基部心形，边缘浅裂。花序1 ~ 2回分枝，苞片椭圆形或狭椭圆形；花萼5裂达基部；花冠粉红色，偶见白色，上唇2深裂，下唇3深裂，筒漏斗状筒形。

花期：5月。

生境：生于海拔400 ~ 1000米的山谷路边、溪边石上或林下。

分布：产华东地区及广东省。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，可栽培于岩石园中观赏。

白接骨

Asystasia neesiana

爵床科，白接骨属。多年生草本，茎高达1米；略呈4棱形。叶卵形至椭圆状矩圆形，边缘微波状至具浅齿，基部下延成柄，叶片纸质。总状花序或基部有分枝，顶生；花单生或对生；苞片2，微小；花萼裂片5；花冠淡紫红色，漏斗状，外疏生腺毛，裂片5，稍不等，花冠筒细长。

花期：8～10月。

生境：生中低海拔的林下或溪边。

分布：产华东、华中、华南、西南等地。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，可栽培于林下或阴湿处作地被使用；叶和根状茎可入药。

少花马蓝

Strobilanthes oliganthus

爵床科，马蓝属。多年生草本，茎高达50厘米，基部节膨大膝曲。叶宽卵形至椭圆形，顶端尖，边具疏锯齿。花数朵集生成头状的穗状花序，苞片叶状；花萼裂片5，条形，约与小苞片等长；花冠淡紫色，花冠筒稍弯曲，外面在裂片部分疏生短柔毛。

花期：8 ~ 9月。

生境：生于山坡林下、林缘阴湿处及溪旁或路旁草地。

分布：产浙江、安徽、江西、福建、湖南。

观赏及其他用途：花大色彩淡雅，可栽培于林下阴湿处观赏；全草可入药。

圆苞杜根藤

Justicia championii

爵床科，杜根藤属。多年生草本，茎直立或披散状。叶椭圆形至矩圆状披针形，顶端略钝或渐尖。紧缩的聚伞花序腋生于上部叶腋，苞片圆形或倒卵状匙形，具短柄，叶状，具羽脉；小苞片无或小；花萼裂片条状披针形，花冠白色，具红色斑点，外被柔毛。

花期：7 ~ 10月。

生境：生于路旁、山坡草丛或林下阴湿处。

分布：产华东、华中、华南及四川、云南省。

观赏及其他用途：可栽培作林下地被观赏；全草可入药。

茶菱

Trapella sinensis

胡麻科，茶菱属。多年生水生草本；根状茎横生，有多数须根。叶对生，沉水叶披针形，疏生锯齿，有短柄；浮水叶肾状卵形或心形，边缘有波状齿，光亮。花单生叶腋，萼齿5，宿存；花冠漏斗状，淡红色，裂片5，圆形。

花期：6月。

生境：常成片生于海拔300米左右的池塘或湖泊中。

分布：产东北、华北、华东及华中部分省区。

观赏及其他用途：可作为水生植物栽培观赏；也可作猪饲料。



高山捕虫堇

Pinguicula alpina

狸藻科，捕虫堇属。多年生食虫草本，单叶数枚基生呈莲座状，质柔软，淡绿色，披针形至长椭圆形，全缘，具短叶柄，上面具无数小腺毛，能分泌一种黏液，为捕捉昆虫之用。花莛直立，1至数条，顶生1花；花白色，花萼5深裂；花冠唇形，裂片近圆形，有距，距淡黄色。

花期：5 ~ 7月。

生境：生海拔2300 ~ 4500米的阴湿岩壁间或高山灌丛下。

分布：产陕西、四川、贵州、云南和西藏。

观赏及其他用途：奇异的食虫草本，可驯化作为小盆栽观赏。

挖耳草

Utricularia bifida

狸藻科，狸藻属。一年生食虫小草本。匍匐枝少数，丝状，具分枝。叶生于匍匐枝上，条状匙形至条形，开花时萎缩，上面生有球形捕虫囊。花序直立，中部以上具疏离的花。花冠黄色，唇形，基部有距，距与萼裂片近等长，略弯曲，上唇短，下唇较长。

花期：6 ~ 12月。

生境：生于海拔40 ~ 1350米的沼泽地、稻田或沟边湿地。

分布：产华东、华中、华南、西南等省。

观赏及其他用途：可栽培作为水生观赏植物。

山梗菜

Lobelia sessilifolia

桔梗科，半边莲属。多年生草本，高60～120厘米。根状茎直立，生多数须根。茎圆柱状，通常不分枝，无毛。叶螺旋状排列，在茎的中上部较密集，厚纸质；叶片宽披针形至条状披针形，边缘有细锯齿。总状花序顶生，花冠蓝紫色，近二唇形。

花期：7～9月。

生境：生于海拔900～3000米左右的平原或山坡湿草地。

分布：产东北、华北、华东、华南及西南部分省区。

观赏及其他用途：常成片生长于潮湿地，花鲜艳美丽，可栽培于沼泽地观赏；全草可入药。

铜锤玉带草

Lobelia nummularia

桔梗科，半边莲属。多年生草本，有白色乳汁。茎平卧，被开展的柔毛，不分枝或在基部有长或短的分枝，节上生根。叶互生，叶片圆卵形、心形或卵形，边缘有牙齿。花单生叶腋；花冠紫红色、淡紫色、绿色或黄白色，5裂，下唇3裂片较上唇2裂片显著长。浆果椭圆状球形，紫红色。

花期：全年大部时间开花。

生境：生于田边、路旁以及丘陵、低山草坡或疏林中的潮湿地。

分布：产华东、华中、华南、西南等地。

观赏及其他用途：可作地被栽培观赏，观花观果俱佳；嫩茎叶可食用；全草可入药。

金钱豹

Campanumoea javanica

桔梗科，金钱豹属。草质缠绕藤本，具乳汁，具胡萝卜状根。叶对生，极少互生，具长柄，叶片心形或心状卵形，边缘有浅锯齿，极少全缘。花单朵生叶腋；花冠白色或黄绿色，内面紫色，钟状，裂至中部。浆果黑紫色，紫红色，球状。

花期：5 ~ 9月。

生境：生于海拔2400米以下的灌丛中及疏林中。

分布：产华东、华中、华南、西南等地。

观赏及其他用途：花色淡雅，果鲜艳美丽，可作为观赏藤本栽培；果实可食用；根可入药和食用。

蓝花参

Wahlenbergia marginata

桔梗科，蓝花参属。多年生柔弱草本，直立或上升，长10 ~ 40厘米。叶互生，常在茎下部密集，下部的匙形，倒披针形或椭圆形，上部的条状披针形或椭圆形。花梗极长，细而伸直，长可达15厘米；花冠钟状，蓝色，5裂至中部或稍过，裂片倒卵状长圆形。

花期：2 ~ 5月。

生境：生于低海拔的田边、路边和荒地中，有时生于山坡或沟边。

分布：产长江流域以南各省区。

观赏及其他用途：野外空旷地常见纤细草本，花色淡雅；根可入药。



沙参

Adenophora stricta

桔梗科，沙参属。茎高40 ~ 80厘米，不分枝，常被短硬毛或长柔毛，稀无毛。基生叶心形，大而具长柄；茎生叶无柄，或仅下部的叶有极短而带翅的柄，叶椭圆形或窄卵形，边缘有不整齐锯齿。花序常不分枝而成假总状花序，花梗常极短，花冠宽钟状，蓝色或紫色，裂片长为全长的1/3。

花期：8 ~ 10月。

生境：生于低山草丛中或岩石缝中。

分布：产华东、华中、西南及河南、陕西省。

观赏及其他用途：花色雅致美丽，形态可爱，可栽培于庭园中观赏；根可入药，也可食用。

茜草科

玉叶金花

Mussaenda pubescens

茜草科，玉叶金花属。攀援灌木，嫩枝被柔毛。叶对生或轮生，卵状长圆形或卵状披针形，两端尖，背面被柔毛。聚伞花序顶生，稠密，花梗极短或无梗；萼筒陀螺状，裂片条形，比萼筒长2倍以上，一些花的1枚裂片扩大成叶状，白色，宽椭圆形，花冠黄色，裂片长圆状披针形。

花期：6 ~ 7月。

生境：生于灌丛、溪谷、山坡。

分布：产华东、华中、华南等地。

观赏及其他用途：花美丽而奇特，宜栽于庭园观赏；茎叶入药。

鸡矢藤

Paederia foetida

茜草科，鸡矢藤属。藤本，枝叶揉碎有臭味，茎无毛或近无毛。叶对生，纸质或近革质，形状变化很大，卵形至披针形。圆锥花序式的聚伞花序腋生和顶生，花具短梗或无；萼管陀螺形，花冠浅紫色，外面被粉状柔毛，内面被茸毛。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔2000米以下的山坡、林中、林缘、沟谷边灌丛中或缠绕在灌木上。

分布：产华东、华中、华南、西南及华北部分省区。

观赏及其他用途：常见杂草；茎叶可入药，还可食用。

白马骨

Serissa serissoides

茜草科，白马骨属。小灌木；枝灰色，被短毛，后脱落。叶通常丛生，薄纸质，倒卵形或倒披针形。花无梗，常多朵簇生小枝顶部，有苞片；苞片膜质，斜方状椭圆形，萼檐裂片5，花冠白色，花冠筒与萼裂片近等长，花冠裂片5，喉部被毛。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于荒地或林缘。

分布：产华东、华南各省区及湖北省。

观赏及其他用途：花洁白美丽，可栽培观赏；全株还可入药。

血满草

Sambucus adnata

忍冬科，接骨木属。多年生高大草本或半灌木，高1 ~ 2米；根和根茎红色，折断后流出红色汁液。茎草质，具明显的棱。羽状复叶具叶片状或条形的托叶；小叶3 ~ 5对，长椭圆形、长卵形或披针形，边缘有锯齿。聚伞花序顶生，伞形式，具总花梗；花小，花冠白色，有恶臭。果实红色，圆形。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔1600 ~ 3600米的林下、沟边、灌丛中、山谷斜坡湿地以及高山草地等处。

分布：产西北、西南各省区。

观赏及其他用途：可栽培于林缘观花观果；全株可入药。

蝴蝶戏珠花

Viburnum plicatum var. *tomentosum*

忍冬科，荚蒾属。落叶灌木。叶纸质，宽卵形或矩圆状卵形，有时椭圆状倒卵形，有不整齐三角状锯齿，下面常带绿白色。聚伞形花序常生于具1对叶的短侧枝上，外围有4～6朵白色不孕花，具长花梗，中央可孕花花冠黄白色。果实先红色后变黑色。

花期：4～5月。

生境：生于海拔200～1800米的山坡、山谷混交林内及沟谷旁灌丛中。

分布：产华东、华中、华南及西南大部省区。

观赏及其他用途：花序硕大，洁白美丽，果红艳可爱，极好的庭园观赏花灌木。

北极花

Linnaea borealis

忍冬科，北极花属。常绿匍匐小灌木，高5 ~ 10厘米；茎细长，红褐色、具稀疏短柔毛。叶圆形至倒卵形，边缘中部以上具1 ~ 3对浅圆齿。花芳香；花冠淡红色或白色，裂片卵圆形，筒外面无毛，内被短柔毛；柱头伸出花冠外。果实近圆形，黄色，下垂。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔750 ~ 2300米的针叶林下，或在树干和长满苔藓的岩石上成片生长。

分布：产黑龙江、吉林、内蒙古、河北、新疆等省。

观赏及其他用途：植株精致小巧，花可爱美丽，有较好的观赏价值。



糯米条

Abelia chinensis

忍冬科，六道木属。落叶灌木，高达2米；嫩枝纤细，红褐色，被短柔毛，老枝树皮纵裂。叶对生，有时三枚轮生，圆卵形至椭圆状卵形，边缘有稀疏圆锯齿。聚伞花序生于小枝上部叶腋，由多数花序集合成一圆锥状花簇；花芳香，花冠白色至红色，漏斗状，花冠裂片5，圆卵形。果实具宿存而略增大的萼裂片。

花期：8 ~ 9月。

生境：分布于海拔150 ~ 1500米的山地、溪沟边。

分布：我国长江以南各省区广泛分布。

观赏及其他用途：本种花多而密集，开花期长，果期宿存的萼裂片变红色，能耐寒，为优美的观赏植物。

果实宿存萼裂片略增大，长时间不凋

鬼吹箫

Leycesteria formosa

忍冬科，鬼吹箫属。灌木，全株常被暗红色腺毛。叶纸质，卵状披针形至卵形，常全缘，有时波状或具疏齿或有不整齐浅缺刻。穗状花序顶生或腋生，花冠白或粉红色，有时带紫红色，漏斗状，被柔毛，裂片圆卵形。果熟时由红至黑紫色。

花期：6 ~ 9月。

生境：生于海拔1100 ~ 3300米的山坡、山谷、溪边或河边林下、林缘或灌丛中。

分布：产西南各省区。

观赏及其他用途：苞片色彩鲜艳，观赏性较好，可栽培于庭园中观赏。

苞片显著，色彩鲜艳

郁香忍冬

Lonicera fragrantissima

忍冬科，忍冬属。半常绿或落叶灌木。幼枝无毛或疏被倒刚毛。叶厚纸质或带革质，叶形变异很大，倒卵状椭圆形至卵状长圆形。花先叶或与叶同放，芳香，生于幼枝基部苞腋；花冠白或淡红色，无毛，唇形。果熟时鲜红色，长圆形，部分连合。

花期：2 ~ 4月。

生境：生于海拔200 ~ 700米山坡灌丛中。

分布：产华北、华东、华中。

观赏及其他用途：花期早而具芳香，果红艳，常植于庭园观赏。

蜘蛛香

Valeriana jatamansi

败酱科，缬草属。多年生草本，高30 ~ 70厘米。茎被短毛；根状茎粗厚微弯，块状圆柱形，节密，有叶柄残茎和苞片，有浓烈香气。叶基生，叶片心状圆形至卵状心形，边缘有疏浅波齿。花序为顶生聚伞花序；花小，白色或微带红色，花萼内卷，花冠筒状。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔2500米以下的山顶草地、林中或溪边。

分布：产华中、西南及河南、陕西等省。

观赏及其他用途：花小巧，洁白美丽，可种于林下作地被观赏；全草可入药或作香料用。

白花刺参

Acanthocalyx alba

刺参科，刺续断属。多年生草本，茎细弱，上部疏被柔毛。基生叶线形，鞘状抱茎，边缘有疏刺毛，两面光滑；茎生叶对生，向上渐小，缘具刺毛。假头状花序顶生和近顶处的叶腋中间有部分花；花萼绿色，花冠白色，不整齐，左右对称。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于海拔3000 ~ 4000米的山坡草甸或林下。

分布：西南地区。

观赏及其他用途：西南高海拔观赏野花；地上部分可入药。

川续断

Dipsacus asper

川续断科，川续断属。高大草本；茎中空，具6～8棱，棱上具下弯粗短硬刺。基生叶稀疏，叶片琴状羽裂，叶柄长；茎生叶在中下部为羽状深裂，上部叶不裂而呈披针形或基部3裂。头状花序球形；花冠淡黄色或白色，花管裂片4。

花期：7～9月。

生境：生于溪沟边、林缘、草丛或路旁。

分布：华东、华中、西南及广西地区。

观赏及其他用途：可栽培于花境中供观赏；著名中药材。

甘肃多榔菊

Doronicum gansuense

菊科，多榔菊属。多年生矮小草本。茎单生稀有匍枝，直立。基部叶及匍枝上叶倒卵状长圆形，具长柄；下部茎叶也具柄；中上部叶卵形至卵状长圆形，无柄，基部心形抱茎，全缘或稀具细齿。头状花序单生茎顶，3～5厘米；舌状花黄色；管状花也为黄色。

花期：6～8月。

生境：生于海拔3000米左右的草坡、林下或岩石缝。

分布：陕西及甘肃的秦岭高海拔地区。

观赏及其他用途：可盆栽供观赏，也可作地被使用。

东风菜

Aster scaber

菊科，紫菀属。多年生草本，上部分枝。基部叶心形，边缘具小尖头，叶柄长达15厘米，花时枯萎；茎上叶片卵状三角形，向上渐小，有具翅短柄。头状花序的总苞半球形，直径4～5毫米，总苞片约3层；缘花舌状，雌性；盘花管状，黄色，两性。

花期：6～10月。

生境：生于中海拔的山坡草地、林缘、道路旁。

分布：华东、华中、华北、东北及华南部分省区。

观赏及其他用途：嫩茎叶可食用，有清凉祛火功效；可入药。

陀螺紫菀

Aster turbinatus

菊科，紫菀属。多年生草本；茎直立不分枝，被糙毛。下部叶在花期枯萎；中部叶无叶柄，长圆形或椭圆状披针形，基部抱茎；往上叶渐小；全部叶片厚纸质，两面具糙毛。头状花序2 ~ 4厘米，单生或簇生叶腋；总苞圆锥形，总苞片多层；缘花舌状，蓝紫色；盘花管状，黄色。

花期：8 ~ 11月。

生境：低海拔山坡、林下。

分布：华东地区。

观赏及其他用途：花序大且密集，观赏性较强，可种植于花境中或林缘观赏。

普陀狗哇花

Aster arenarius

菊科，紫菀属。多年生丛生草本，分枝多。基生叶匙形，全缘或有疏齿；下部叶在花期枯萎；中上部叶匙形或匙状矩圆形；所有叶片具缘毛。头状花序单生枝顶，2.5 ~ 3厘米；总苞半球形，约2层，绿色。舌状花1层，雌性，淡蓝色或淡白色；管状花两性，黄色，裂片5。

花期：8 ~ 11月。

生境：海滨沙地及岩石缝间。

分布：浙江沿海地区。

观赏及其他用途：花淡雅可爱，花期长，可栽培于庭园中供观赏。

大头橐吾

Ligularia japonica

菊科，橐吾属。多年生高大草本。下部叶片大型，掌状3～5全裂，裂片复裂，叶柄基部扩大抱茎；中部以上叶与下面的叶同形而渐小。头状花序组成伞房状；总苞半球形，直径1.5～2.5厘米，总苞片9～12层；缘花舌状，黄色，雌性；盘花管状，两性，黄色。

花期：6～8月。

生境：生于中海拔山坡草丛、林下或溪沟边。

分布：华东、华中、华南及台湾。

观赏及其他用途：花序壮大，花色鲜艳，可栽培于林下观赏。

林荫千里光

Senecio nemorensis

菊科，千里光属。多年生直立草本，茎粗壮。基生叶及下部叶在花期凋落；中部茎叶近无柄，披针形或长圆状披针形，基部渐狭或半抱茎，边缘密具齿；上部叶渐小，线状披针形至线形，无柄。头状花序排成复伞房花序。总苞近圆柱形；舌状花8 ~ 10，黄色，长圆形；盘花黄色，15 ~ 16个。

花期：6 ~ 11月。

生境：生于海拔700 ~ 3000米的林中开阔处、草地或溪沟边。

分布：西北、华北、华东、华中、西南及台湾。

观赏及其他用途：植株壮硕，花色亮丽，可栽培于林缘或水边观赏。

大吴风草

Farfugium japonicum

菊科，大吴风草属。多年生草本；茎花莛状。叶莲座状基生，肾形，基部心形；叶柄长，基部扩大呈鞘状；茎生叶呈苞叶状，小，无柄，抱茎。头状花序4 ~ 6厘米，排列成疏散伞房状；总苞钟形或宽陀螺形，总苞片2层；缘花舌状，黄色；盘花管状，黄色。

花期：7 ~ 10月。

生境：生于低海拔山坡林下、山谷或滨海地区草丛中或林下。

分布：华东地区。

观赏及其他用途：叶硕大美丽，花色鲜艳，适应性强，可成片栽培于林下作地被使用，也可布置于花园中，效果极佳；全草可入药。

野菊

Chrysanthemum indicum

菊科，菊属。多年生草本。茎直立或铺散。基生叶和下部叶在花期脱落；中部茎叶卵形至椭圆状卵形，羽状半裂至仅有浅锯齿状，叶两面淡绿色，被疏短柔毛。头状花序直径1.5 ~ 2.5厘米，多数排列成疏散的伞房花序或伞房圆锥花序；总苞片5层。舌状花黄色，顶端全缘或2 ~ 3齿；盘状花小，黄色。

花期：8 ~ 11月。

生境：生于山坡草地、林缘、灌丛、河边湿地、田边或路旁等处。

分布：东北、华北、华中、华东、华南及西南各地。

观赏及其他用途：可栽培于庭园中或盆栽供观赏；叶、花、茎可入药。



加拿大一枝黄花

Solidago canadensis

菊科，一枝黄花属。多年生草本，根状茎发达。叶披针形或线状披针形。茎上部及叶等处有短糙毛。头状花序很小，大量，在茎顶组成开展的大型圆锥花序；总苞片线状披针形；缘花舌状；缘花及盘花都为黄色。

花期：8 ~ 10月。

生境：道路旁、村庄附近、抛荒地均有逸生，在华东地区已对其他生物造成侵害。

分布：华东、华南、华中及西南各省均有逸生。

观赏及其他用途：可用作插花材料。

滴水珠

Pinellia cordata

天南星科，半夏属。多年生草本，块茎球形至长圆形。单叶，叶柄顶端常有珠芽1枚。叶片心形至心状戟形，表面绿色或具斑纹，背面绿色或红紫色。佛焰苞绿色或青紫色；肉穗花序，附属器渐狭为线形，略呈之字形上升。

花期：3 ~ 6月。

生境：生于海拔800米以下的林下溪边、潮湿的岩石隙、岩壁上等。

分布：华东、华中、华南及贵州省。

观赏及其他用途：可栽培于岩石园或盆栽观赏；块茎有小毒，可药用。

一把伞南星

Arisaema erubescens

天南星科，天南星属。多年生草本。叶放射状分裂，裂片7，几裂至基部，裂片披针形至椭圆形，先端长渐尖呈丝状。佛焰苞绿色，喉部稍膨大，展开处外卷；肉穗花序单性；附属物棒状。

花期：5 ~ 7月。

生境：山区、半山区的林下、灌丛、林缘荒地等处。

分布：除东北、新疆、内蒙、江苏、山东等省外全国均有分布。

观赏及其他用途：块茎可入药。

水竹叶

Murdannia triquetra

鸭跖草科，水竹叶属。多年生草本，具长横走根状茎；茎下部匍匐，节上生根，上部上升，多分枝。叶无柄，叶片似竹叶，全缘。花通常单生枝顶兼腋生；花粉红色、紫红色，花丝密生须毛。

花期：8 ~ 10月。

生境：生于海拔1600米以下的水稻田、溪沟边。

分布：华北、华东、华南、华中、西南部分省区。

观赏及其他用途：可作牲畜饲料；嫩茎叶可食用；全草可入药。

杜若

Pollia japonica

鸭跖草科，杜若属。茎直立，单一。叶片椭圆形或长圆形，全缘，基部渐狭呈柄状。圆锥花序，花梗被白色短柔毛；总苞片叶状；花瓣白色，稍带淡红色，倒卵状匙形。浆果成熟时蓝色。

花期：6 ~ 9月。

生境：山坡林下或溪沟边潮湿处。

分布：华中、华东、华南及西南各省区。

观赏及其他用途：叶硕大浓绿，花小巧洁白，果色彩美丽，可栽培作林下地被观赏；全草可入药。

谷精草

Eriocaulon buergerianum

谷精草科，谷精草属。多年生丛生草本。叶线形，半透明且具横格。花莛多数，具棱；花序成熟时近球形，禾秆色；总苞片禾秆色；花单性，通常雌雄花混生于同一花序上；花冠裂片3，近锥形。

花期：7 ~ 10月。

生境：中海拔的梯田水沟或沼泽、潮湿地。

分布：华中、华东、华南及西南各省区。

观赏及其他用途：花时星星点点，小巧精致；全草可入药。

水烛

Typha angustifolia

香蒲科，香蒲属。多年生水生或沼生草本。根状茎乳黄色，先端白色。叶长线形，可达100厘米，基部扩大成抱茎的鞘。穗状花序长30 ~ 60厘米，上部位雄花序，下部为雌花序，中间相隔数厘米。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于湖泊、河流及池塘的浅水处或沼泽地。

分布：全国大部省区均有分布。

观赏及其他用途：可栽培于湿地景观中观赏，适应性极强；嫩茎可食用；叶可编织；花粉可入药。

郁金

Curcuma aromatica

姜科，姜黄属。多年生草本。根状茎肥大，芳香。叶基生，叶片长圆形，正面无毛，背面被短柔毛。花葶由根茎抽出，穗状花序圆柱形，有花的苞片淡绿色，无花的苞片白色带淡红色；花冠裂片白色带粉红色，后方一片明显大；唇瓣黄色。

花期：4 ~ 6月。

生境：山区林下。

分布：华东、华南及西南各省，常栽培。

观赏及其他用途：可栽培作地被观赏；块茎可入药。

姜花

Hedychium coronarium

姜科，姜花属。多年生草本。叶片长圆状披针形至披针形，长20 ~ 40厘米，无柄。穗状花序顶生；苞片覆瓦状排列，每苞片内有花2 ~ 3朵；花白色，顶端一侧开裂；花冠裂片后方的一枚呈兜状；唇瓣倒心形，白色，基部稍黄。

花期：8 ~ 11月。

生境：生于林下阴湿处。

分布：华南、西南各省；长江以南各省区常见栽培。

观赏及其他用途：花美丽、芳香，可栽培于庭园中观赏，也常作插花。

凤眼蓝

Eichhornia crassipes

雨久花科，凤眼蓝属。浮水草本，在浅水处根生泥中，侧生匍枝易形成新植株。叶莲座状丛生；叶片卵形至肾圆形，先端圆钝，有光泽。叶柄中部常膨大成球形或纺锤形的气囊。花茎单生；穗状花序；花被蓝紫色，裂片卵形至倒卵形，上方裂片较大，具黄蓝斑块。

花期：7 ~ 9月。

生境：生于池塘、河渠、水田、江面。

分布：原产南美，长江以南均有栽培或逸生。

观赏及其他用途：繁殖迅速，生长极为茂盛，常种植于静水中观赏；嫩叶可食用或作牲畜饲料。应用时要预防过度繁殖而阻塞河道等。

鸭舌草

Monochoria vaginalis

雨久花科，雨久花属。湿生草本，全株光滑无毛。叶形及大小多变，由心状宽卵形至披针形都有，具弧状脉，叶柄基部扩大成开裂的鞘。总状花序从叶柄中部生出；花蓝色，花被片卵状披针形或长圆形。

花期：8～10月。

生境：生于海拔1500米以下的稻田、水沟、浅水池塘等处。

分布：南北各省几乎都有分布。

观赏及其他用途：花小巧，色彩淡雅，可用于湿地公园浅水处栽培观赏；嫩茎叶可食用，也可用作牲畜饲料。

卷丹

Lilium tigrinum

百合科，百合属。植株高可达1.5米，茎上具紫色纹及白色绵毛。叶矩圆状披针形至披针形，上部叶腋有珠芽。花数朵；苞片叶状；花梗紫色有白绵毛；花橙红色，花被片反卷，有紫黑色斑点。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔400 ~ 2500米的山坡灌木林下、草地、路边和溪沟旁。

分布：全国大部省区均有分布。

观赏及其他用途：花色鲜艳，可栽培于庭园中或盆栽供观赏，也可作为插花使用；鳞茎可食用。

药百合

Lilium speciosum var.gloriosoides

百合科，百合属。多年生草本，鳞茎近扁球形，直径5厘米左右。茎高1米左右。叶散生，宽披针形至卵状披针形，两面无毛。花1至数朵，排成总状或伞形花序；花下垂，花被片反卷，边缘波状，白色，基部有紫红色斑块及斑点，蜜腺两边有红色突起。

花期：7 ~ 8月。

生境：生于海拔600 ~ 900米的山坡草丛或溪边林下。

分布：安徽、浙江、江西、湖南及广西。

观赏及其他用途：花大且色彩艳丽，著名的观赏花卉，也可作插花使用；鳞茎可食用。

大百合

Cardiocrinum giganteum

百合科，大百合属。高大草本。鳞茎卵形，直径1.2 ~ 2厘米。茎直立，中空，无毛。叶纸质，卵状心形至心形。总状花序具多数花，无苞片；花狭喇叭形，白色，内面具淡紫红色条纹；花被片条状倒披针形。

花期：5 ~ 7月。

生境：海拔1500 ~ 2300米的山林草丛中或山谷溪边。

分布：西藏、四川、陕西、湖南、广西。

观赏及其他用途：植株高大壮观，花序硕大美丽，栽培观赏效果极佳；鳞茎可食用和药用。

长梗黄精

Polygonatum filipes

百合科，黄精属。多年生草本，根状茎连珠状或有时“节间”稍长。叶互生，矩圆状披针形至椭圆形。伞形花序具数朵花，总梗细长，3 ~ 8厘米，丝状；花淡黄绿色，花冠裂片短。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔200 ~ 800米的山坡、林下或灌丛中。

分布：华东及湖南、江西、广东。

观赏及其他用途：叶形秀丽，花纤细可爱，可栽培做地被观赏；根状茎可入药。

花总梗细长呈丝状

藠头（荞头）

Allium chinense

百合科，葱属。具芳香。鳞茎常数枚聚生。叶数枚，无柄；叶片三棱或五棱状线形，常具3～5细纵棱，中空。花莛侧生，半圆柱状，实心；伞形花序近半球形；花淡紫色至暗紫色，花被片基部合生。

花期：10～11月。

生境：山坡路边草地。

分布：长江流域以南各省均有野生或栽培。

观赏及其他用途：花小巧，色彩淡雅，成片开放极富情趣；鳞茎可食用。

萱草

Hemerocallis fulva

百合科，萱草属。多年生草本，具多数纺锤状肉质根。叶基生，2列；叶片宽线形至线状披针形。花莛高于叶片，圆锥花序；花大型，橘红色至橘黄色，近漏斗状，花冠裂片6，内外各三个，边缘波状。

花期：6 ~ 8月。

生境：生于山坡林下、沟边阴湿处及沼泽地等。

分布：秦岭以南各省区，也常见栽培。

观赏及其他用途：花大色艳，适应性强，可用于花园栽培或湿地栽培观赏；花可食用；根可入药。

大花万寿竹

Disporum megalanthum

百合科，万寿竹属。根肉质。茎中部以上具叶。叶纸质，卵形至宽披针形，基部常对折抱茎，边缘有乳头状突起。伞形花序着生于茎端或与上部叶对生；花梗具棱；花大，洁白，花被片狭倒卵状披针形，基部具短距。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔1500 ~ 2500米的山坡、林下或林缘等处。

分布：四川、湖北、陕西、甘肃等省。

观赏及其他用途：花洁白美丽，栽培观赏效果好。

管花鹿药

Maianthemum henryi

百合科，鹿药属。茎中部以上具毛，少无毛。叶纸质，椭圆形至矩圆形，两面有伏毛或无毛，基部具短柄或无。花乳白色或带紫褐色，排成总状花序生于枝顶，有时成圆锥花序；花被高脚碟状，花被裂片短；花丝极短。浆果成熟时红色。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔1300 ~ 4000米的林下、水旁潮湿地或林缘。

分布：西北、华中、西南及浙江省。

观赏及其他用途：叶圆润，花小巧秀气，可栽培于阴凉潮湿处观赏。

延龄草

Trillium tschonoskii

百合科，延龄草属。多年生草本。叶三枚，轮生于茎顶，无叶柄，叶菱状卵圆形或菱形，全缘。单花顶生，外轮花被片3，绿色，内轮花被片3，白色，偶淡紫色；雄蕊6；子房圆锥形卵状。

花期：4 ~ 6月。

生境：生于海拔1800 ~ 3500米的阔叶林下。

分布：华东、西南、西北及湖北、甘肃等省。

观赏及其他用途：花洁白美丽，可开发作为林下地被观赏；根状茎可药用。

七筋姑

Clintonia udensis

百合科，七筋姑属。叶3 ~ 4枚，纸质或厚纸质，椭圆形至倒披针形，无毛或幼时边缘有柔毛，基部呈鞘状抱茎或后期伸长成柄状。花莛密生白色短柔毛，总状花序具多花；花白色，少有淡蓝色；花被片矩圆形。

花期：5 ~ 6月。

生境：生于海拔1600 ~ 4000米的高山林下。

分布：东北、西北、华北、华中及西南各省区。

观赏及其他用途：花小巧洁白，叶形秀丽，可驯化栽培作林下地被观赏；根可入药。

西藏洼瓣花

Lloydia tibetica

百合科，洼瓣花属。基生叶3 ~ 10枚，茎生叶2 ~ 3枚，向上过渡为苞片，通常无毛。花单生或排成顶生的伞房花序；花被片黄色，近倒卵形，具淡紫绿色脉纹，花被片内面下部或近基部两侧各具1 ~ 4个鸡冠状褶片，并疏生短毛。

花期：5 ~ 7月。

生境：生于海拔2300 ~ 4000米的山坡、草地、疏林下或林缘。

分布：西北、西南及湖北省。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，点缀于草丛中格外显眼；鳞茎可入药。

山菅

Dianella ensifolia

百合科，山菅兰属。叶狭条状披针形，坚硬，基部稍收狭成鞘状或套叠抱茎，边缘具锯齿。圆锥花序分枝疏散；花被片条状披针形，绿白色、淡黄色至青紫色。浆果近球形，深蓝色。

花期：3 ~ 8月。

生境：生于海拔1700米以下的山坡、林下及草丛中。

分布：华东、华南及西南部分省区。

观赏及其他用途：植株四季浓绿，花色美丽，果鲜艳可爱，可栽培于花境中、庭园内、林缘等处观赏；根状茎可入药。

叶狭条状披针形、坚硬

浆果深蓝色

老鸦瓣

Tulipa edulis

百合科，郁金香属。叶2枚，长条形，柔弱。花单朵顶生，靠近花基部具2枚狭条形苞片；花被片6，狭椭圆状披针形，白色，背面具紫纵纹。蒴果近球形，具长喙。

花期：3～4月。

生境：生于山坡草地、路旁、林下。

分布：华中、华东及山东、陕西、辽宁等省。

观赏及其他用途：花色淡雅，形态可爱，可作林下地被观赏；鳞茎可入药。

石蒜

Lycoris radiata

石蒜科，石蒜属。鳞茎宽椭圆形或近圆球形，直径1～3.5厘米。叶秋季花谢后抽出，次年夏季枯萎，叶片狭带状，先端钝，中间常有粉绿带。伞形花序有4～7花；鲜红色，花被裂片狭倒披针形，强度皱缩并向外卷曲。

花期：8～10月。

生境：生于海拔200～1200米的林缘、山坡、沟边石缝或山间路边。

分布：华东、华南、西南及湖北、陕西、河南等省。

观赏及其他用途：花鲜艳美丽，成片栽培做林下地被观赏效果极佳；鳞茎可入药。

花鲜红色，花被裂片强度皱缩并向外卷曲

忽地笑

Lycoris aurea

石蒜科，石蒜属。鳞茎肥大，直径5 ~ 7厘米。叶基生，秋季抽出，剑形，质厚。花茎上具佛焰苞状总苞片2枚；伞形花序，花黄色，花被片6，倒披针形，边缘皱缩，向后反卷，雄蕊明显比花被片长。

花期：8 ~ 9月。

生境：生于海拔700 ~ 1500米的阴湿山坡或林下。

分布：华东、华南及湖北、云南等省。

观赏及其他用途：叶片宽，花色艳丽，成片种植于林下做地被观赏效果极佳。

西南鸢尾

Iris bulleyana

鸢尾科，鸢尾属。多年生草本。叶基生，条形，基部鞘状。花茎中空，生有2 ~ 3片茎生叶；花天蓝色，外花被片倒卵形，无附属物，具蓝紫色斑点及条纹，内花被裂片直立，披针形或宽披针形。

花期：6 ~ 7月。

生境：生于海拔2300 ~ 3500米的山坡草地或溪流旁湿地中。

分布：四川、云南及西藏高海拔地区。

观赏及其他用途：花大且色彩鲜艳，可成片栽培于疏林中或水边观赏。

玉蝉花

Iris ensata

鸢尾科，鸢尾属。多年生草本，植株基部具残留纤维。叶条形，基部鞘状。花茎圆柱形，实心，具1～3枚茎生叶；苞片3枚，内有2朵花；花深紫色，外花被裂片上中脉有黄色斑纹，内花被裂片小，狭披针形或宽条形。

花期：6～7月。

生境：生于河岸湿地或沼泽地。

分布：东北、山东和浙江。

观赏及其他用途：花色艳丽，可栽培做地被观赏或用于湿地栽培观赏。

射干

Belamcanda chinensis

鸢尾科，射干属。叶互生，嵌迭状排列，剑形，基部鞘状抱茎。花序顶生；花橙红色，散生紫褐色斑点，花被裂片6，排成2轮，内轮花被裂片较外轮短而狭。蒴果倒卵形或长椭圆形。

花期：6～8月。

生境：生于林缘或山坡和溪沟边草丛。

分布：我国大部省区均有分布。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，可栽培于花境中观赏或做插花等；根茎入药。

百部

Stemona japonica

百部科，百部属。茎下部直立，上部攀援状。叶2 ~ 5枚轮生，卵形至卵状长圆形，边缘微波状；基出5脉，有时可达9条。花单生或数朵排成聚伞状花序贴生于叶片中脉上；花被片淡绿色，开放后向背面反卷。

花期：5 ~ 6月。

生境：山坡灌丛草地或林缘。

分布：分布于华东及华中部分省区。

观赏及其他用途：花着生位置较为奇特；根可入药。

黄独

Dioscorea bulbifera

薯蓣科，薯蓣属。缠绕草质藤本。茎左旋，光滑无毛。叶腋内有珠芽，单叶互生，卵状心形，顶端尾状渐尖。雄花序穗状，下垂，数个丛生或呈圆锥状；雄花花被片新鲜时紫色；雌花序与雄花序相似。

花期：7 ~ 10月。

生境：生于海拔2000米以下的河谷、山谷沟旁、林缘或房前屋后。

分布：华中、华东、西北、华南及西南各省区。

观赏及其他用途：栽培品种的块茎可食用；块茎可入药。



纤草

Burmannia itoana

水玉簪科，水玉簪属。一年生腐生草本。茎高5 ~ 15厘米，不分枝或顶部有1 ~ 3分枝，蓝紫色。茎生叶退化成鳞片状，披针形至卵形；苞片和茎生叶相似。花1 ~ 2朵顶生，翅紫色；外轮花被裂片卵状三角形，质厚，内轮花被片圆形。

花期：10 ~ 11月。

生境：生于腐殖质较厚的林下。

分布：广东、广西、台湾等省。

观赏及其他用途：株形小巧玲珑，形态奇特，色彩艳丽，野外偶遇常会惊叹其独特的姿态及色彩。

西藏杓兰

Cypripedium tibeticum

兰科，杓兰属。具粗壮且短的根状茎。茎基部具数枚鞘，鞘上方通常具3枚叶。叶椭圆形至宽椭圆形，边缘具细缘毛。单花顶生；花苞片叶状；花大，俯垂，紫色、紫红色或暗栗色，常有斑纹，唇瓣的囊口周围有白色或浅色的圈。

花期：5 ~ 8月。

生境：生于海拔2300 ~ 4200米的疏林下、林缘、山坡地或乱石堆。

分布：西南各省及甘肃。

观赏及其他用途：花形及色彩俱佳，极好的观赏植物，可驯化作为庭园观赏植物或盆栽。

杏黄兜兰

Paphiopedilum armeniacum

兰科，兜兰属。地生或半附生草本。叶基生，二列，具5～7枚叶，叶长圆形，坚革质，上面有明显网格斑，背面有密集紫斑。花莛直立，顶端具2花；花纯黄色，直径7～9厘米；唇瓣深囊状，边缘内折。

花期：2～4月。

生境：生于海拔1400～2100米的石灰岩壁上或多石的草坡上。

分布：云南。

观赏及其他用途：花形圆润可爱，色彩亮丽，已开发作为室内盆栽植物观赏。

广布小红门兰

Ponerorchis chusua

兰科，小红门兰属。块茎长圆形或圆球形。茎基部具1～3枚筒状鞘，上具1～5枚叶。叶长圆状披针形至线形，基部成抱茎的鞘。花序具多数花，偏向一侧；花紫红色或粉红色，中萼片凹陷呈舟状，与花瓣靠合呈兜状；侧萼片向后反折。

花期：6～8月。

生境：生于海拔500～4500米的山坡林下、岩石中、灌丛下或高山草地中。

分布：东北、西北、西南及湖北省等。

观赏及其他用途：花小巧，色彩鲜艳美丽，常成丛分布，极美丽的野生兰花。

石斛

Dendrobium nobile

兰科，石斛属。茎直立，肉质肥厚，稍扁，上部多少弯曲。叶革质，长圆形，先端钝且不等侧2裂，基部具抱茎的鞘。总状花序具数朵花；花大，白色带淡紫色先端，有时全体淡紫红色或唇盘上具1个紫红色斑块。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于海拔400 ~ 1700米的山林树干上或山谷岩石上。

分布：华南、西南及湖北省。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，盆栽观赏效果极好。

斑叶兰

Goodyera schlechtendaliana

兰科，斑叶兰属。茎绿色，具4 ~ 6枚叶。叶片卵形或卵状披针形，上面绿色且具白色不规则点状斑纹，叶柄基部扩大成抱茎的鞘。总状花序常偏向一侧；花小，白色或带粉色，半张开；中萼片与花瓣黏合呈兜状。

花期：8 ~ 10月。

生境：生于海拔500 ~ 2800米的山坡阔叶林下。

分布：西北、华中、华东、华南及西南各省。

观赏及其他用途：花小巧可爱，可盆栽观赏花及叶片；全草可入药。

金线兰

Anoectochilus roxburghii

兰科，开唇兰属。茎直立，具3 ~ 4枚叶。叶片卵圆形或卵形，上面暗紫色或黑紫色，具红色带有绢丝光泽的网脉，背面淡紫红色；叶柄基部扩大成抱茎的鞘。总状花序具花2 ~ 6朵；花白色或淡红色，唇瓣位于上方；萼片与花瓣粘合呈兜状；唇瓣先端2侧具流苏状。

花期：8 ~ 11月。

生境：富含腐殖质的常绿阔叶林下或沟谷阴湿处。

分布：华东、华南、西南及湖南省。

观赏及其他用途：叶色奇特美丽，可盆栽观赏；全草可入药。

唇瓣先端2侧具流苏状

叶片上面暗紫色或黑紫色，具红色网脉，背面淡紫红色

无柱兰

Amitostigma gracile

兰科，无柱兰属。弱小草本。茎纤细，基部具1 ~ 2枚筒状鞘，近基部具1枚大叶，上面具1 ~ 2枚苞片状小叶。叶片长椭圆形至卵状披针形。总状花序具多花，偏向一侧；花小，粉红色或紫红色；唇瓣较萼片和花瓣大，中裂片较侧裂片大；距纤细，下垂。

花期：6 ~ 7月。

生境：生于海拔200 ~ 3000米的山坡沟谷边或林下阴湿处岩石上或山坡灌丛中。

分布：华东、华中、华北、西南各省区及辽宁、陕西等省。

观赏及其他用途：花极为小巧可爱。

白及

Bletilla striata

兰科，白及属。假鳞茎扁球形。叶4～6枚，狭长圆形或披针形，基部收狭成鞘并抱茎。花序具3～10朵花；花序轴多少曲折；花大，紫红色或粉红色；花瓣稍宽于萼片；唇瓣稍短，白色带紫红色，唇盘上具5条纵褶片。

花期：4～5月。

生境：生于海拔100～3200米的常绿阔叶林下、针阔混交林下、山坡草丛或岩石缝中。

分布：西北、华东、华南、西南部分省区。

观赏及其他用途：花色鲜艳美丽，可成片栽培作地被使用；假鳞茎可药用。

美冠兰

Eulophia graminea

兰科，美冠兰属。假鳞茎卵球形至近球形，常带绿色，多少露出地面。叶3 ~ 5枚，花后出现，线形至线状披针形；叶柄套叠成短的假茎。花莛从假鳞茎一侧节上生出，中部以下具鞘；花序总状；花橄榄绿色，唇瓣白色且具淡紫红色褶片，三裂。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于疏林草坡上或山坡向阳处、海边沙滩林中。

分布：产于华南、西南及安徽省。

观赏及其他用途：草坪中常见的美丽杂草。

蕙兰

Cymbidium faberi

兰科，兰属。假鳞茎不明显。叶5 ~ 8枚，长带形，边缘常具粗锯齿。花莛从叶丛基部最外面叶腋抽出；总状花序；花多为浅黄绿色，唇瓣有紫红色斑，香味浓郁；花瓣与萼片相似，近披针状长圆形或狭倒卵形；唇瓣长圆状卵形，3裂，唇盘上具2条纵褶片。

花期：3 ~ 5月。

生境：生于海拔500 ~ 3000米的林下湿润且排水良好、透光好，富含疏松腐殖土处。

分布：西北、华东、华中、华南、西南大部省区。

观赏及其他用途：叶形雅致，花香馥郁，常为文人雅士所喜爱，盆栽观赏。

竹叶兰

Arundina graminifolia

兰科，竹叶兰属。植株较高大，有时可达1米。茎圆柱形，细竹竿状，通常为叶鞘包裹，具多枚叶。叶线状披针形，薄革质或坚纸质。总状或圆锥状花序具数花，但每次仅开1朵花；花粉红色或略带紫色或白色；萼片与花瓣近等长；唇瓣近长圆状卵形，3裂。

花期：9 ~ 11月。

生境：生于海拔400 ~ 2800米的草坡、溪谷旁草丛、灌丛或林中。

分布：华东、华南、西南及湖南省。

观赏及其他用途：可栽培于庭园中观赏；根茎可入药。

石仙桃

Pholidota chinensis

兰科，石仙桃属。根状茎粗壮，匍匐；假鳞茎狭卵状长圆形，大小变化大。2枚叶生于假鳞茎顶端，倒卵状椭圆形至近长圆形。花莛生于幼嫩假鳞茎顶端；总状花序；花白色或带浅黄色；侧萼片略狭于中萼片；花瓣披针形；唇瓣轮廓近宽卵形，略3裂，下半部凹陷成半球形的囊。

花期：4 ~ 5月。

生境：生于海拔2000米以下的林中或林缘树上、岩壁上等。

分布：华东、华南、西南的部分省区。

观赏及其他用途：植株小巧，花色淡雅，玩家常栽培观赏；民间也入药。

虾脊兰

Calanthe discolor

兰科，虾脊兰属。根状茎不明显。假鳞茎粗短，具3～4枚鞘和3枚叶。叶倒卵状长圆形至椭圆状长圆形，基部收狭为柄。花莛从假茎上端叶间抽出，总状花序；萼片和花瓣褐紫色；唇瓣白色，轮廓为扇形，3深裂，中裂片前端边缘有时具不整齐齿。

花期：4～5月。

生境：生于海拔600～1500米的常绿阔叶林下富含腐殖土处。

分布：华东、湖北、广东和贵州。

观赏及其他用途：可盆栽观赏或作地被栽培。

三、参考文献

[1] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志.北京：科学出版社，1963-2003.

[2] 中国科学院植物研究所主编.中国高等植物图鉴：(1-5册).北京：科学出版社，1972-1976.

[3] Zheng-Yi WU，Peter Hamilton RAVEN（eds）.flora of china.Beijing：Science Press，1994-2011.

[4] 中国科学院昆明植物研究所.云南植物志.北京：科学出版社，1977-2005.

[5] 中国科学院青藏高原综合科学考察队，吴征镒.西藏植物志.北京：科学出版社，1983-1987.

[6] 浙江植物志编委会.浙江植物志.杭州：浙江科学技术出版社，1989-1993.

[7] 中国科学院西北植物研究所.秦岭植物志.北京：科学出版社，1974-1985.

[8] 福建植物志编写组.福建植物志.福州：福州科学技术出版社，1982-1994.

[9] 安徽植物志协作组.安徽植物志：1-3卷.北京：中国展望出版社，1988-1990.

[10] 安徽植物志协作组.安徽植物志：4-5卷.合肥：安徽科学技术出版社，1991-1992.

[11] 刑福武.中国景观植物：上、下册.武汉：华中科技大学出版社，2009.

[12] 张旭乐，林霞，刘洪见等.浙江省野生花境植物资源及观赏应用初步研究.中国农学通报，2011，27（13）：296-300.

[13] 孟锐，张丽荣，张启翔.滇西北野生观赏植物资源受威胁因素及保护对策.湖北大学学报（自然科学版），2011.09.33（3）：297-303.

[14] 赵芳，张改霞，李先敏.太白山兰科植物资源及其保护利用.中国林副特产，2009.12.6：75-77.

[15] 周涛，朴永吉，林元雪.中国野生花卉资源的研究现状与展望.世界林业研究，2004.08月.17（4）：45-48.

[16] 李秀娟，李虹，黄仁征等.广西百合科野生花卉资源的研究与应用.湖南农业大学学报（自然科学版），2008.08，34（4）：442-449.

[17] 周繇.长白山国家级自然保护区观赏植物资源及其多样性.东北林业大学学报，2004.11.32（6）：45-50.

[18] 黄苏珍，韩玉林，谢明云等.中国鸢尾属观赏植物资源的研究与利用.中国野生植物资源，2003.22（1）：4-7.

[19] 王昌腾.浙江省蔷薇科野生观赏植物资源与园林应用.安徽农业科学，2007.35（23）：7162-7165.

[20] 王辉，马丹丹，钟泰林等.浙江产苦苣苔科种质资源及分布特点.浙江农林大学学报，2011.28（4）：538-545.

[21] 叶喜阳，乔利超.金缕梅科植物的春天.园林，2013.4：66-67.

四、拉丁学名索引

A

Abelia chinensis /257
Acanthocalyx alba /261
Aconitum carmichaeli /31
Actinidia chinensis /83
Adenophora stricta /250
Ajuga decumbens /215
Akebia quinata /53
Allium chinense /286
Alniphyllum fortunei /117
Amitostigma gracile /309
Anagallis arvensis /124
Androsace laxa /125
Anemone flaccida /34
Anemone rivularis /33
Angelica decursiva /196
Anoectochilus roxburghii /308
Aquilegia ecalcarata /42
Arabis flagellosa /99
Arisaema erubescens /273
Aristolochia debilis /25
Arundina graminifolia /313
Asarum forbesii /23
Asarum sieboldii /24
Aster arenarius /266
Aster scaber /264
Aster turbinatus /265
Asystasia neesiana /240

B

Balanophora involucrata /181
Bauhinia championii /158
Begonia grandis subsp. *sinensis* /95
Begonia palmata /94
Belamcanda chinensis /299
Berberis virgetorum /49
Bergenia purpurascens /143
Bletilla striata /310
Boenninghausenia albiflora /187
Bostrychanthera deflexa /216
Brasenia schreberi /28
Bredia quadrangularis /177
Briggsia chienii /237
Burmannia itoana /302

C

Caesalpinia decapetala /157
Calanthe discolor /315
Caltha palustris /30
Camellia fraterna /80
Campanumoea javanica /248
Cardamine macrophylla /98
Cardiandra moellendorffii /140
Cardiocrinum giganteum /284
Cardiospermum halicacabum /186
Caryopteris nepetifolia /214
Celosia argentea /67
Cerasus discoidea /156
Chimonanthus nitens /18
Chionanthus retusus /222
Chirita eburnea /238
Chloranthus fortunei /20
Chrysanthemum indicum /270
Chrysosplenium japonicum /146
Clematis apiifolia /36
Clematis montana /37
Clerodendron trichotomum /213
Clintonia udensis /291
Comastoma pulmonarium /199
Conandron ramondioides /234
Cornus kousa subsp. *chinensis* /179
Corydalis decumbens /60
Corydalis incisa /59
Corylopsis sinensis /61
Crateva formosensis /96
Cratoxylum cochinchinense /84
Crotalaria spectabilis /166
Curcuma aromatica /278
Cymbidium faberi /312

Cynanchum auriculatum /201
Cynanchum inamoenum /202
Cynoglossum amabile /212
Cypripedium tibeticum /303

D

Daphne aurantiaca /171
Daphne genkwa /173
Daphne kiusiana var. *atrocaulis* /172
Decaisnea insignis /52
Delphinium anthriscifolium /32
Dendrobium nobile /306
Deutzia ningpoensis /138
Dianella ensifolia /293
Diapensia purpurea /114
Dichocarpum dalzielii /38
Didymocarpus heucherifolius /239
Dinetus racemosus /208
Dioscorea bulbifera /301
Dipsacus asper /262
Disporum megalanthum /288
Doronicum gansuense /263
Drosera rotundifolia /87
Dysosma pleiantha /46

E

Eichhornia crassipes /280
Elaeagnus multiflora /169
Elatostema stewardii /65
Elsholtzia cliliata /220
Enkianthus quinqueflorus /102
Eomecon chionantha /56
Epilobium hirsutum /175
Epimedium sagittatum /48
Eriocaulon buergerianum /276
Eulophia graminea /311
Euphorbia helioscopia /182
Euphrasia hirtella /227
Eurya muricata /82
Euscaphis japonica /184
Eutrema yunnanense /101
Exochorda racemosa /149

F

Fagopyrum dibotrys /79
Farfugium japonicum /269
Fragaria vesca /152

G

Gentiana davidii /197
Gentiana rubicund /198
Geranium carolinianum /189
Geranium platyanthum /190
Glycine soja /168
Goodyera schlechtendaliana /307
Gymnotheca involucrata /22
Gynostemma pentaphyllum /93

H

Halerpestes tricuspis /43
Hamamelis mollis /64
Hanceola sinensis /221
Hedychium coronarium /279
Hemerocallis fulva /287
Hemiboea subcapitata /235
Hydrangea strigosa /141
Hylomecon japonica /55
Hylotelephium mingjinianum /135

I

Illicium lanceolatum /26
Impatiens chinensis /194
Impatiens chlorosepala /193
Impatiens davidii /191
Impatiens tienmushanica /192
Indigofera decora /161
Ipomoea triloba /209
Iris bulleyana /297
Iris ensata /298

J

Justicia championii /242

K

Kadsura longipedunculata /27
Kerria japonica /154

L

Lamium barbatum /217

Ledum palustre var. *dilatatum* /103
Lespedeza floribunda /162
Leycesteria formosa /258
Ligularia japonica /267
Lilium speciosum var. *gloriosoides* /283
Lilium tigrinum /282
Linnaea borealis /256
Lithospermum zollingeri /211
Lloydia tibetica /292
Lobelia nummularia /247
Lobelia sessilifolia /246
Lonicera fragrantissima /259
Loropetalum chinense /63
Lotus corniculatus /163
Lychnis senno /68
Lycianthes biflora /206
Lycoris aurea /296
Lycoris radiata /295
Lyonia ovalifolia var. *hebecarpa* /110
Lysimachia barystachys /122
Lysimachia congestiflora /121
Lysimachia paridiformis /120
Lysionotus pauciflorus /236

M

Macleaya cordata /57
Mahonia bealei /50
Maianthemum henryi /289
Malus mandshurica /151
Mandragora caulescens /205
Meconopsis quintuplinervia /58
Megacodon stylophorus /200
Melastoma dodecandrum /176
Melochia corchorifolia /85
Menyanthes trifoliata /210
Merremia hederacea /207
Michelia maudiae /16
Millettia dielsiana /164
Moneses uniflora /112
Monochasma savatieri /228
Monochoria vaginalis /281
Monotropa uniflora /113
Mosla scabra /219
Murdannia triquetra /274
Mussaenda pubescens /251

N

Nasturtium officinale /100

O

Orobanche alba /233
Osbeckia stellata /178
Oxalis griffithii /188
Oyama sieboldii /17

P

Paederia foetida /252
Paeonia anomala subsp. *veitchii* /45
Paeonia delavayi var. *lutea* /44
Paphiopedilum armeniacum /304
Parnassia palustris /147
Pedicularis davidii /229
Pedicularis muscicola /232
Pedicularis oederi var. *sinensis* /230
Pedicularis spicata /231
Philadelphus zhejiangensis /139
Pholidota chinensis /314
Photinia beauverdiana /150
Phytolacca americana /66
Pinellia cordata /272
Pinguicula alpina /244
Piptanthus concolor /167
Pittosporum tobira /133
Pollia japonica /275
Polygala japonica /183
Polygonatum filipes /285
Polygonum amphibium /78
Polygonum capitatum /74
Polygonum orientale /73
Polygonum senticosum /75
Ponerorchis chusua /305
Potentilla glabra /153
Primula chionantha /131
Primula cockburniana /129
Primula merrilliana /127
Primula purdomii /126

Primula secundliflora /132
Primula sikkimensis /130
Primula sonchifolia /128
Pseudostellaria heterophylla /72
Pterostyrax corymbosus /118

R

Ranunculus sceleratus /35
Rehmannia chingii /225
Rheum palmatum /76
Rhodiola dumulosa /134
Rhododendron delavayi /107
Rhododendron fortunei /106
Rhododendron mariesii /104
Rhododendron ovatum /105
Rhododendron purdomii /108
Rhododendron rubiginosum /109
Rhodoleia championii /62
Rodgersia aesculifolia /142
Rosa omeiensis /155
Rotala rotundifolia /170
Rumex japonicus /77

S

Sambucus adnata /254
Sanicula orthacantha /195
Sarcandra glabra /19
Sargentodoxa cuneata /51
Saururus chinensis /21
Saxifraga stolonifera /144
Sedum alfredii /136
Sedum majus /137
Semiaquilegia adoxoides /41
Senecio nemorensis /268
Serissa serissoides /253
Silene fortunei /70
Sinopodophyllum hexandrum /47
Solanum lyratum /204
Solanum nigrum /203
Solidago canadensis /271
Souliea vaginata /29
Spiraea × *vanhouttei* /148
Stachys japonica /218
Staphylea holocarpa var. *rosea* /185
Stauntonia leucantha /54
Stellaria alsine /69
Stellaria media /71
Stemona japonica /300
Stewartia sinensis /81
Strobilanthes oliganthus /241
Styrax faberi /116
Styrax obassia /115
Symplocos paniculata /119
Syringa wolfii /223

T

Thalictrum delavayi /39
Thalictrum fortunei /40
Thlaspi arvense /97
Tiarella polyphylla /145
Tibetia yunnanensis /159
Trapella sinensis /243
Trichosanthes cucumeroides /92
Trientalis europaea /123
Trillium tschonoskii /290
Tulipa edulis /294
Typha angustifolia /277

U

Urena procumbens /86
Utricularia bifida /245

V

Vaccinium mandarinorum /111
Valeriana jatamansi /260
Verbascum thapsus /224
Veronica persica /226
Viburnum plicatum var. *tomentosum* /255
Vicia cracca /165
Viola biflora /91
Viola chaerophylloides /90
Viola diffusa /88
Viola philippica /89
Viscum coloratum /180

W

Wahlenbergia marginata /249
Wikstroemia indica /174
Wisteria sinensis /160

五、中文名索引（按拼音顺序）

A

阿拉伯婆婆纳 /226
安徽羽叶报春 /127

B

白苞裸蒴 /22
白花刺参 /261
白花列当 /233
白花龙 /116
白及 /310
白接骨 /240
白鹃梅 /149
白马骨 /253
白檀 /119
白英 /204
百部 /300
百脉根 /163
斑叶兰 /307
北极花 /256
博落回 /57

C

草珊瑚 /19
草绣球 /140
草玉梅 /33
茶菱 /243
长梗黄精 /285
长腺小米草 /227
橙花瑞香 /171
赤杨叶 /117
臭节草 /187
川赤芍 /45
川续断 /262
垂序商陆 /66
莼菜 /28
刺蓼 /75

D

大百合 /284
大花万寿竹 /288
大头囊吾 /267
大托叶猪屎豆 /166
大卫氏马先蒿 /229
大吴风草 /269
大血藤 /51
大叶碎米荠 /98
大钟花 /200
单花荻 /214
倒地铃 /186
倒提壶 /212
滴水珠 /272
地茨 /176
棣棠花 /154
吊石苣苔 /236
吊钟花 /102
东风菜 /264
东南景天 /136
豆瓣菜 /100
独丽花 /112
杜衡 /23
杜若 /275
钝药野木瓜（短药野木瓜） /54
多花胡枝子 /162

E

峨眉蔷薇 /155
鹅黄灯台报春 /129
鹅掌草 /34

F

繁缕 /71
梵天花 /86
飞蛾藤 /208
凤眼蓝 /280

G

甘肃多榔菊 /263
高山捕虫堇 /244
格药柃 /82
谷精草 /276
牯岭凤仙花 /191
瓜子金 /183
管花鹿药 /289
广布小红门兰 /305
广布野豌豆 /165
鬼吹箫 /258
过路惊 /177

H

孩儿参 /72
海桐 /133
海州常山 /213
荷青花 /55
红毒茴 /26
红花荷 /62
红花岩梅 /114
红蓼 /73
红丝线 /206
红棕杜鹃 /109
喉毛花 /199
忽地笑 /296
槲寄生 /180
蝴蝶戏珠花 /255
虎耳草 /144
华东唐松草 /40
华凤仙 /194
华马先蒿 /230
还亮草 /32

黄独 /301
黄花木 /167
黄牡丹 /44
黄牛木 /84
黄三七 /29
黄水枝 /145
蕙兰 /312

J

鸡矢藤 /252
櫸木 /63
加拿大一枝黄花 /271
剪秋罗 /68
江南越橘 /111
姜花 /279
降龙草 /235
绞股蓝 /93
菔头（荠头） /286
金疮小草 /215
金缕梅 /64
金钱豹 /248
金荞麦 /79
金线兰 /308
苣叶报春 /128
卷丹 /282
蕨叶人字果 /38

K

刻叶紫堇 /59
苦苣苔 /234
宽叶杜香 /103
阔叶十大功劳 /50

L

蜡瓣花 /61
蜡莲绣球 /141
蓝花参 /249
狼尾花 /122
老鸦瓣 /294
篱栏网 /207
两栖蓼 /78
辽东丁香 /223
了哥王 /174
裂叶秋海棠 /94
林荫千里光 /268
临时救（聚花过路黄） /121
菱叶绣线菊 /148
流苏树 /222
琉璃繁缕 /124
柳叶菜 /175
六角莲 /46
龙葵 /203
龙须藤 /158
庐山楼梯草 /65
庐山小檗 /49
落地梅 /120
驴蹄草 /30
绿萼凤仙花 /193

M

马兜铃 /25
马松子 /85
马银花 /105
马缨杜鹃 /107
满山红 /104
猫儿屎 /52
毛柄连蕊茶 /80
毛果珍珠花 /110
毛蕊花 /224
毛蕊老鹳草 /190
毛瑞香 /172
毛山荆子 /151
毛药花 /216
玫红省沽油 /185
梅花草 /147
美冠兰 /311
闽赣长蒴苣苔 /239
木半夏 /169
木通 /53

N

南山堇菜 /90
南五味子 /27
宁波溲疏 /138
牛耳朵 /238
牛皮消 /201
女萎 /36
糯米条 /257

P

偏翅唐松草 /39
偏花报春 /132
匍匐南芥 /99
普陀狗哇花 /266

Q

七瓣莲 /123
七筋姑 /291
七星莲 /88
七叶鬼灯檠 /142
茄参 /205
秦巴点地梅 /125
青葙 /67
雀舌草 /69

R

日本金腰 /146

S

三白草 /21
三裂碱毛茛 /43
三裂叶薯 /209
三枝九叶草 /48
沙参 /250
沙氏鹿茸草 /228
山酢浆草 /188
山梗菜 /246
山菅 /293
山蜡梅 /18
山飘风 /137
陕西杜鹃 /108

少花马蓝 /241
射干 /299
深红龙胆 /198
深山含笑 /16
石斛 /306
石龙芮 /35
石荠苎 /219
石蒜 /295
石仙桃 /314
双花堇菜 /91
水晶兰 /113
水苏 /218
水竹叶 /274
水烛 /277
睡菜 /210
丝穗金粟兰 /20
四轮香 /221
四照花 /179
穗花马先蒿 /231

T

桃儿七 /47
天葵 /41
天目地黄 /225
天目山凤仙花 /192
天女木兰 /17
庭藤 /161
铜锤玉带草 /247
筒鞘蛇菰 /181
头花蓼 /74
陀螺紫菀 /265

W

挖耳草 /245
王瓜 /92
乌头 /31
无距耧斗菜 /42
无柱兰 /309
五岭龙胆 /197
五脉绿绒蒿 /58

X

西藏杓兰 /303
西藏洼瓣花 /292
西南鸢尾 /297
莕菜 /97
细辛 /24
虾脊兰 /315
夏天无 /60
纤草 /302
藓生马先蒿 /232
香花崖豆藤 /164
香薷 /220
小丛红景天 /134
小叶白辛树 /118
星毛金锦香 /178
杏黄兜兰 /304
绣球藤 /37
萱草 /287
血满草 /254
血水草 /56

Y

鸭舌草 /281
延龄草 /290
芫花 /173
岩白菜 /143
羊踯躅 /77
药百合 /283
野草莓 /152
野大豆 /168
野菊 /270
野老鹳草 /189
野鸦椿 /184
野芝麻 /217
一把伞南星 /273
银露梅 /153
迎春樱桃 /156
蝇子草 /70
鱼木 /96
玉蝉花 /298
玉铃花 /115
玉叶金花 /251
郁金 /278
郁香忍冬 /259
圆苞杜根藤 /242
圆叶节节菜 /170
圆叶茅膏菜 /87
云锦杜鹃 /106
云南高山豆 /159
云南山萮菜 /101
云实 /157
泽漆 /182

Z

掌叶大黄 /76
浙江山梅花 /139
浙皖粗筒苣苔 /237
蜘蛛香 /260
直刺变豆菜 /195
中华猕猴桃 /83
中华秋海棠 /95
中华石楠 /150
钟花报春 /130
竹灵消 /202
竹叶兰 /313
梓木草 /211
紫花八宝 /135
紫花地丁 /89
紫花前胡 /196
紫花雪山报春 /131
紫茎 /81
紫罗兰报春 /126
紫藤 /160